

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
СИЛИБОР 70
(SILIBOR 70)

СИЛИБОР 140
(SILIBOR 140)

Общая характеристика:

основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы карамельного цвета. Содержимое капсулы – смесь гранул и порошка светло-желтого или коричневатого-желтого цвета, допускается наличие агломератов частиц. На капсулу допускается наносить товарный знак предприятия- ЗТ

состав: 1 капсула содержит силибора или силимарина в пересчете на 100 % содержание силимарина (сумы флаволигнанов) 70 мг или 140 мг;

вспомогательные вещества: кросповидон, кальция стеарат, лактозы моногидрат.

Форма выпуска. Капсулы.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Гепатотропные препараты. Силимарин. Код АТС А05В А03.

Фармакологические свойства. Силибор содержит смесь флавоноидов (силибинин, силикрестин, силидианин) из плодов расторопши пятнистой – *Silybum marianum* (L.).

Фармакодинамика. Гепатопротекторное средство, механизм действия которого обусловлен антиоксидантной и мембраностабилизирующей активностью. Улучшает обмен веществ в гепатоцитах: нормализует обмен фосфолипидов, стимулирует синтез структурных и функциональных белков, РНК и гликогена. Препятствует проникновению гепатотоксичных веществ в клетки печени и ускоряет процессы регенерации гепатоцитов.

Фармакокинетика. Медленно всасывается из желудочно-кишечного тракта (период полуабсорбции – 2,2 часа), метаболизируется в печени путем конъюгации. До 40 % выделяющегося с желчью силимарина поступает в цикл энтерогепатической циркуляции. Выводится преимущественно с желчью в виде глюкуронидов и сульфатов, в меньшей степени – с мочой. Период полувыведения – 6 часов. В организме не накапливается.

Показания к применению. Хронические гепатиты, циррозы печени различной этиологии (в составе комплексной терапии), стеатогепатоз. Как профилактическое средство при угрозе воздействия экзогенных гепатотоксических веществ и длительном применении лекарственных средств, ухудшающих функции печени.

Способ применения и дозы. Принимают до еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 70 мг 3 раза в день. Пациентам с тяжелыми формами заболевания суточную дозу при необходимости можно увеличить до 420 мг, разделенных на 3 приема. Детям в возрасте от 6 до 9 лет назначают по 70 мг один раз в сутки, от 9 до 12 лет – по 70 мг 2 раза в сутки. Длительность лечения – 1 месяц; при необходимости можно увеличить до 3 месяцев. Длительность лечения можно повторить через 1-2 месяца. Как профилактическое средство назначают в суточной дозе 70 мг 1-2 раза в день. Длительность профилактического приема – до 1 месяца.

Побочное действие. Редко возможны диспепсические явления (диарея) и аллергические реакции (кожные высыпания, зуд), увеличение диуреза. При длительных курсах приема препарата может наблюдаться усиление существующих нарушений со стороны вестибулярного аппарата

