

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ОТРИВІН
(OTRIVIN)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: ксилометазолін; 2-(4 -тетра-бутил-2 -6 -диметилбензил)-імідазолін;

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний, розчин без запаху;

склад: 1 мл розчину містить ксилометазоліну гідрохлориду – 0,5; 1 мг;

допоміжні речовини: бензалконію хлорид, динатрію едетат, натрію фосфат одноосновний, натрію фосфат двоосновний, натрію хлорид, вода деіонізована.

Форма випуску. Краплі для носа.

Фармакотерапевтична група. Протинабрякові засоби для місцевого застосування при захворюваннях носа. АТС R01A A07.

Фармакологічні властивості. Ксилометазолін належить до групи арилпіклових імідазолінів. Отривін, який застосовують для закапування в ніс, звужує кровоносні судини слизової оболонки носа, усуваючи тим самим набряк слизової носа і носоглотки.

Дія Отривіну настає через декілька хвилин після застосування і триває протягом декількох годин. Отривін добре переноситься пацієнтами з чутливою слизовою оболонкою і не порушує функцію війчастого епітелію. Реактивна гіперемія після застосування препарату практично не виникає.

Фармакокінетика. Після місцевого застосування концентрація ксилометазоліну в плазмі крові настільки мала, що його неможливо визначити за допомогою сучасних аналітичних методів.

Показання для застосування. Гострий риніт, синусит (для полегшення відтоку секрету), середній отит (у складі комбінованої терапії для зменшення набряку слизової оболонки носоглотки), для полегшення проведення риноскопії.

Спосіб застосування та дози. Краплі «Отривін» 1% призначають тільки дорослим та дітям старшим 6 років. Середня доза - по 2 - 3 краплі в кожному ніздрю 4 рази на день.

Краплі «Отривін» 0,05% можна застосовувати у немовлят та дітей віком до 6 років. Достатньо по 1 - 2 краплі в кожному ніздрю 1 - 2 рази на день, але застосовувати не більше 3 разів на день.

Побічна дія. Іноді спостерігалися такі побічні реакції, як відчуття печіння в носі та горлі, місцева подразнення, нудота, головний біль і сухість слизової оболонки носа.

Протипоказання. Як і інші судинозвужувальні препарати, Отривін не слід застосовувати після трансфеноїдальної гіпофізектомії або після хірургічних втручань, при яких оголювалась тверда мозкова оболонка, а також тим пацієнтам, які гіперчутливі до речовин, що входять до складу препарату.

Передозування. Повідомлень про передозування у дорослих немає. У поодиноких випадках, при випадковому отруєнні препаратом у дітей, клінічна картина проявлялась, головним чином, розвитком таких симптомів, як почастішання пульсу та аритмія, підвищення артеріального тиску, іноді сплутаність свідомості. Слід проводити симптоматичне лікування під наглядом лікаря.

Особливості застосування. Пацієнтам з підвищеною чутливістю до адренергічних засобів, що викликають безсоння, запаморочення, слід призначати Отривін з великою обережністю, як і інші препарати, що належать до цього класу активних речовин. Отривін не рекомендується застосовувати протягом тривалого часу, наприклад, при хронічному нежиті. *Вагітність і лактація.*

Під час вагітності препарат не слід призначати. У період лактації препарат можна застосовувати тільки під наглядом лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Можливе посилення системної дії Отривіну у разі одночасного застосування трициклічних або тетрациклічних антидепресантів, особливо якщо перевищуються рекомендовані дози препарату.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30 С. Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 10 мл у флаконах.

Виробник. Новартіс Консьюмер Хелс СА.

Адреса. 1260, м.Ніон, Швейцарія.