

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ОТРИВІН
(Otrivin®)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: ксилометазолін, 2-(4-tert-бутил-2,6-диметилбензил)-2-імідазолу гідрохлорид;

основні фізико-хімічні властивості: розчин прозорий, від безбарвного до жовтуватого кольору, майже без запаху;

склад: 1 мл розчину містить ксилометазоліну гідрохлориду 1 мг;

допоміжні речовини: натрію дигідрофосфату дигідрат, динатрію фосфату додекагідрат, динатрію едетат, бензалконію хлорид, сорбітол 70%, гіпромелоза, натрію хлорид, вода очищена.

Форма випуску. Спрей назальний дозований.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Код АТС R01A A07.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Ксилометазолін є симпатоміметичним агентом, що діє на α -адренергічні рецептори.

Отривін викликає звуження назальних кровоносних судин, зменшуючи набряк слизової оболонки носа, його придаткових пазух і, таким чином, поліпшуючи носове дихання при закладеності носа та придаткових пазух.

Дія препарату починається через декілька хвилин після застосування та зберігається до 10 годин.

Препарат добре переноситься, в тому числі у хворих з чутливою слизовою оболонкою. Препарат не знижує мукоциліарну функцію. Отривін має збалансоване значення рН в межах, властивих для носової порожнини. Завдяки зволожуючим компонентам (сорбітол, гіпромелоза) препарат зменшує сухість та подразнення назальних ходів.

Фармакокінетика. При місцевому застосуванні концентрації ксилометазоліну у плазмі настільки малі, що їх неможливо визначити сучасними аналітичними методами.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування закладеності носа при застуді, сінній гарячці, алергічних ринітах, синуситах.

Для полегшення відтоку секрету при захворюваннях придаткових пазух носа.

Допоміжна терапія у випадках середнього отиту (для усунення набряку слизової оболонки).

Для полегшення проведення риноскопії.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі та діти старші 6 років:

Перед введенням препарату слід ретельно прочистити ніс.

По 1 впорскуванню (відповідає 0,14 мг ксилометазоліну на одне впорскування) в кожний носовий хід 3-4 рази на добу.

Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання і не повинна перевищувати 10 днів поспіль.

Побічна дія.

Звичайно препарат добре переноситься.

Інколи можливі такі небажані ефекти: відчуття печіння у носі або горлі, місцеве подразнення або сухість слизової оболонки носа, нудота, головний біль.

Рідко спостерігались системні алергічні реакції, тимчасове порушення зору, прискорене або

нерегулярне серцебиття..

Протипоказання.

Гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; трансфеноїдальна гіпофізектомія та хірургічні втручання з оголюванням мозкової оболонки в анамнезі.

Дитячий вік до 6 років.

Препарат не можна застосовувати в період вагітності.

Передозування.

Рідко відмічалось передозування препарату у дітей, клінічна картина характеризувалась головним чином прискореним і нерегулярним пульсом, підвищенням кров'яного тиску, інколи - втратою свідомості.

Лікування – симптоматичне.

Особливості застосування.

Препарат не слід застосовувати більше 10 днів поспіль. Більш тривале лікування препаратом може спричинити зворотний ефект.

Препарат слід з обережністю призначати пацієнтам, які при застосуванні адренергічних препаратів мають сильні реакції, які виявляються у вигляді безсоння, запаморочення, тремтіння, серцевої аритмії, підвищення кров'яного тиску.

Не слід перевищувати рекомендовану дозу препарату, особливо при лікуванні дітей та осіб літнього віку.

Слід з обережністю призначати препарат пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, хворим на артеріальну гіпертензію, гіпертеріоз, закритокутову глаукому або цукровий діабет.

Вплив на здатність керувати транспортними засобами та механізмами. Препарат не впливає при застосуванні у дозах, що рекомендуються.

Вагітність. Препарат не можна приймати в період вагітності.

Лактація. Жінкам, які годують груддю, можна застосовувати препарат тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.

Можливо збільшення системного ефекту ксилометазоліну при одночасному прийомі з трициклічними або тетрациклічними антидепресантами, особливо у випадку передозування.

Умови та термін зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 С.

Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 10 мл у полімерному флаконі з розпилювачем.

По 1 флакону у картонній коробці.

Виробник. Новартіс Консьюмер Хелс СА, Швейцарія /
Novartis Consumer Health SA, Switzerland.

Адреса. CH-1260 Нюн, рут де Летра, Швейцарія/
CH-1260, Nyon, route de l'Etraz, Switzerland.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

