

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПУЛЬМЕКС БЕБІ
(PULMEX BABY)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: однорідна мазь білого кольору, із запахом бальзамічних масел;

склад: 1 г мазі містить: бальзам перуанський синтетичний, вільний від смол – 60 мг, олія евкаліптова ефірна – 50 мг, олія розмаринова ефірна – 50 мг;

допоміжні речовини: карбомер 974Р, натрію гідроксид 30%, полісорбат 20, вода очищена.

Форма випуску. Мазь для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Комбіновані препарати для місцевого застосування при застудних захворюваннях. Код АТС R05X.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Активні речовини, що входять до складу препарату мають місцеву протинабрякову, відхаркувальну та антисептичну дію. Мазь не подразнює здорову шкіру, не залишає жирних слідів і плям на одязі.

Фармакокінетика. Бензойна кислота і бензоат натрію, які входять до складу перуанського бальзаму, легко всмоктуються і виводяться нирками через кілька годин у вигляді гіпурової кислоти.

1,8-цинеол (евкаліптол) виводиться нирками і легеньми. Він метаболізується шляхом гідроксилювання з подальшою кон'югацією гідроксильованих похідних.

Показання для застосування. Як допоміжний засіб при лікуванні захворювань дихальних шляхів: бронхіту, запальних та інфекційно-запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем.

Спосіб застосування та дози. Смужку мазі довжиною 0,5-1 см наносять на передню і задню поверхню грудної клітки, після чого обережно втирають і накривають сухою теплою тканиною. Дітям після 6 місяців життя рекомендується проведення 2 процедур щоденно; дітям старше 3 років - 2 – 3 рази на добу. Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання.

Побічна дія. Є дані про виникнення реакцій шкірної сенсibiliзації після застосування перуанського бальзаму.

Протипоказання. Підвищена чутливість до однієї з активних речовин препарату. Наявність судом в анамнезі.

Передозування. Є повідомлення про передозування олії евкаліптової (особливо у дітей внаслідок помилкового прийому препарату внутрішньо). Симптоми - нудота, блювання, спастичний біль в животі, головний біль, виражене запаморочення, почервоніння обличчя, утруднене дихання, делірій, судоми, пригнічення ЦНС і кома.

Призначають активоване вугілля, сольове проносне і промивання шлунка. Судоми можна купірувати повільним внутрішньовенним введенням діазепаму або, за необхідності, барбітуратів короткочасної дії.

Особливості застосування. Мазь не можна наносити на слизові оболонки (особливо носа і рота), на обпечені поверхні і на уражену шкіру. При потраплянні препарату в очі або на слизову оболонку промити холодною водою. Не ковтати і не смоктати. Не слід застосовувати Пульмекс Бебі у дітей до 6 місяців.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. У клінічних дослідженнях не було відзначено будь-яких взаємодій Пульмексу Бебі.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці, при температурі нижче 30 С. Термін придатності – 5 років.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 20 г у тубах.

Виробник. Новартіс Консьюмер Хелс СА, Швейцарія / Novartis Consumer Health SA, Switzerland.

Адреса. CH-1260 Нйон, рут де Летра, Швейцарія/ CH-1260, Nyon, Route de l'Etraz, Switzerland.