

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ПІКОВІТ® Д**  
**PIKOVIT® D**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** жовті, оранжеві, зелені та червоні круглі, випуклі таблетки, вкриті оболонкою;

**склад:** 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить:

|  |          |
|--|----------|
| ретинолу (вітамін А як ретинолу пальмітат)         | 600 М.О. |
| холекальциферолу (вітамін D <sub>3</sub> )         | 80 М.О.  |
| кислоти аскорбінової (вітамін С)                   | 10 мг    |
| нікотинаміду                                       | 3 мг     |
| кальцію пантотенату                                | 1,2 мг   |
| піридоксину гідрохлориду (вітамін В <sub>6</sub> ) | 0,3 мг   |
| рибофлавіну (вітамін В <sub>2</sub> )              | 0,3 мг   |
| тіаміну мононітрату (вітамін В <sub>1</sub> )      | 0,25 мг  |
| кислоти фолієвої                                   | 0,04 мг  |
| ціанокобаламіну (вітамін В <sub>12</sub> )         | 0,20 мкг |
| кальцію (кальцій, у вигляді кальцію гідрофосфату)  | 12,50 мг |
| фосфору (фосфор, у вигляді кальцію гідрофосфату)   | 10 мг    |

**допоміжні речовини:** мальтитол, мальтитол рідкий, манітол, повідон, магнію стеарат, гліцерол, олія рицинова, полісорбат 80, кремній колоїдний безводний, капол 600, β-каротин (Е 160а), титану діоксид (Е 171), барвник жовтий хіноліновий (Е 104), барвник блакитний індиго (Е 132), барвник червоний (Е 172), ароматизатор малиновий.

**Форма випуску.** Таблетки, вкриті оболонкою.

**Фармакотерапевтична група.** Полівітаміни з мінералами. Код АТС А11А А03.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Препарат містить десять найважливіших вітамінів, кальцій та фосфор. Він не містить цукру, який сприяє росту та розмноженню бактерій, тому він не викликає карієс. Препарат містить манітол та мальтитол, що надають таблеткам приємний смак. Вітаміни, що входять до складу препарату, регулюють численні біохімічні процеси в організмі. Вітаміни групи В (В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, пантотенова кислота, фолієва кислота та нікотинамід) беруть участь в метаболізмі вуглеводів, жирів та білків, а також у функціонуванні нервової системи. Фолієва кислота важлива для нормальної регенерації і правильного функціонування клітин крові. Для розвитку епітеліальних клітин та синтезу зорового пігменту необхідний вітамін А. Вітамін Д регулює засвоєння кальцію і сприяє, таким чином, мінералізації кісток та зубів. Вітамін С прискорює засвоєння заліза і бере участь у багатьох окисно-відновних реакціях організму. Кальцій і фосфор - головні будівельні компоненти кісток та зубів.

**Показання для застосування.** Для забезпечення підвищеної потреби дитячого організму у вітамінах, кальцію та фосфорі, і відшкодування дефіциту у вітамінах та мінералах при дієтах; у тому числі дітям при поганому апетиті, перевтомі у школярів, як доповнення при антибіотикотерапії, як вітамінна добавка при дієтах.

**Спосіб застосування та дози.** Для профілактики гіповітамінозу: дітям від 4 до 6 років - по 1 таблетці 1 - 2 рази на добу; дітям від 7 до 14 років - по 1 таблетці 2-3 рази на добу.

**Як лікувальна доза:** дітям від 4 до 6 років - по 4 таблетки на добу; дітям від 7 до 14 років - по 5 таблеток на добу.

Таблетки Піковіт Д слід розсмоктувати у роті.

Інструкцію завантажено з сайту [www.dovgolit.com](http://www.dovgolit.com)

При зниженому апетиті Піковіт Д слід приймати протягом 2 місяців, в інших випадках - час від часу за необхідністю.

**Побічна дія.** У призначених дозах Піковіт Д не викликає побічних ефектів. Якщо розвиваються симптоми алергії, прийом таблеток слід припинити та проконсультуватись з лікарем. Піковіт Д містить 0,6 мг мальтитолау.

**Протипоказання.** Піковіт Д не слід давати дітям з підвищеною чутливістю до будь-якого з компонентів препарату, або при доведеному гіпервітамінозі А та Д. Піковіт Д не рекомендується дітям до 4 років.

**Передозування.** Тривалий прийом Піковіту Д в дуже високих дозах може викликати гіпервітаміноз А та Д, хоча при прийомі Піковіту Д можливість передозування мінімальна. Прийом доз, що перевищують рекомендовані, може викликати діарею.

**Особливості застосування.** Дози вітамінів у Піковіті Д адаптовані для дітей. Хворі на діабет можуть приймати Піковіт Д, але слід мати на увазі, що кожна таблетка містить 0,6 г мальтитолау, а отже денна доза становить 2,4 – 4,2 г мальтитолау. Для метаболізму мальтитолау необхідний інсулін, але внаслідок повільного гідролізу та шлунково-кишкової абсорбції, потреба в інсуліні дуже низька. Енергетична цінність однієї таблетки, вкритої оболонкою, становить близько 6 кДж (1,4 ккал).

Піковіт Д, таблетки, вкриті оболонкою, відрізняються за кольором, але не відрізняються за складом.

Оскільки вони містять в більшості натуральні барвники, з часом можливі незначні зміни кольору, але це ніяк не впливає на якість продукту.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Взаємодія Піковіту Д з іншими лікарськими засобами не встановлена.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати при температурі до 30 °С, у захищеному від світла та вологи місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності - 3 роки.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** 30 таблеток, вкритих оболонкою (2 блістери по 15 таблеток червоного, жовтого, зеленого та оранжевого кольору) у картонній коробці.

**Виробник** КРКА, д.д., Ново место, Словенія.

**Адреса.** Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место, Словенія.