

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПЕРЕКИС ВОДНЮ

Склад лікарського засобу.

Діюча речовина: водню пероксид;
100 мл розчину містять водню пероксиду (30 %) 10 г;
допоміжні речовини: натрію бензоат, вода очищена.

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування 3 %.

Прозора безбарвна рідина.

Назва і місцезнаходження заявника.

ТОВ «Фаргомед»
Київська обл., смт. Іванків, вул. Фрунзе, 53

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ЛГЗ «Тетерів»
Київська обл., смт. Іванків, вул. Фрунзе, 49

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфекційні засоби.

Код АТС D08A X01.

Фармакологічні властивості. При контакті розчину водню перекису з ушкодженою шкірою та слизовими оболонками вивільняється активний кисень, який сприяє очищенню ранової поверхні та інактивації органічних речовин (протеїн, кров, гній). При застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості мікроорганізмів. Препарат має кровоспинний ефект.

Показання для застосування. Препарат застосовують для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому ушкодженні тканин, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до препарату. Не вводять у порожнини та глибокі рани (можливість емболії).

Належні заходи безпеки при застосуванні. Застосування розчину на пов'язку забезпечує безболісне зняття її з рани. Велика кількість піни, що утворюється, сприяє механічному очищенню рани від гною і тканинного детриту.

Водню перекис не можна використовувати для зрошення порожнин.

Препарат нестабільний у лужному середовищі, у присутності металів, складних радикалів деяких оксидантів, а також на світлі і в теплі. Слід уникати потрапляння розчину в очі.

Особливі застереження. Відсутні.

Спосіб застосування та дози. Розчин наносять на ушкоджену ділянку шкіри для дезінфекції ран per se (тобто без розведення). Для полоскання розчиняють

1 столову ложку в 1 склянці води; для аплікацій, обробки ранових поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділянки обробляють тампоном, просоченим розчином. Тривалість лікування залежить від досягнутого ефекту.

Передозування. Не спостерігалось.

Побічні ефекти. Можливе відчуття печіння в момент обробки рани. У деяких випадках при індивідуальній чутливості до компонентів препарату можливе виникнення місцевих алергічних реакцій. При тривалому застосуванні для обробки слизової оболонки рота можлива гіпертрофія сосочків язика.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Взаємодія поки що невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. При температурі не вище 25 °С, у захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 мл у флаконах полімерних, по 100 мл у банках скляних та флаконах полімерних.

Категорія відпуску. Без рецепта.