

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ІМПАЗА
(IMPAZA)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: Таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На плоскій стороні з рискою нанесено напис MATERIA MEDICA, на іншій плоскій стороні нанесено напис IMPAZA.

Склад: 1 таблетка містить антитіла до ендотеліальної NO – синтази афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень C12, C30 та C200 – 0,003 г.

допоміжні речовини: лактоза, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат

Форма випуску. Таблетки гомеопатичні.

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний препарат. Засоби, що застосовуються при еректильній дисфункції.

Фармакологічні властивості. Препарат усуває порушення ерекції та відновлює чоловічу потенцію. Препарат підвищує активність ендотеліальної NO – синтази, відновлює вироблення ендотелієм оксиду азоту (NO) при сексуальній стимуляції, підвищує вміст у гладких м'язах циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ) та сприяє їх розслабленню, що призводить до підвищення кровонаповнення печеристих тіл. Вказані ефекти забезпечують достатню за силою та тривалістю ерекцію.

В умовах ендотеліальної дисфункції ефект препарату розвивається поступово.

За рахунок позитивної дії на центральні механізми регуляції ерекції препарат підвищує лібідо (статевий потяг) та задоволеність статевим актом.

Тривалий прийом препарату сприяє підвищенню вмісту тестостерону у сироватці (при помірно зниженому вихідному рівні).

Показання для застосування. Порушення ерекції (еректильна дисфункція) різного походження.

Спосіб застосування та дози. Внутрішньо. По 1 таблетці на прийом, поза прийомом їжі. Таблетку тримають у роті (не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.

Варіанти застосування:

1. Періодичний прийом. Для стимулювання ерекції препарат приймається у день очікуваного статевого зв'язку двічі: 1 таблетку за 2 години до статевого акту і 1 таблетку за 1 годину до нього.

2. Регулярний прийом. Для стабілізації статевої потенції (здатності до статевого акту) за наявності органічних факторів захворювання рекомендований лікувальний курс тривалістю 12 тижнів, протягом якого препарат приймають по 1 таблетці з частотою від 1 разу в 2 дні до 2 разів на добу, бажано в вечірній час.

За необхідності курсову терапію рекомендовано повторити через 3 – 6 місяців.

Побічна дія. Не спостерігалася.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Передозування. При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, зумовлені наповнювачами у складі лікарської форми. Терапія симптоматична.

Особливості застосування. Можливе використання у чоловіків пітнього віку.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Випадки несумісності з іншими лікарськими засобами (в тому числі з органічними нітратами) не зареєстровані.

Умови та термін зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 20 таблеток у блістері, разом з інструкцією для медичного застосування або листком – вкладишем у картонній коробці.

Виробник. ТОВ “НВФ “Матеріа Медика Холдинг”, Російська Федерація.

Адреса. Росія, 127473, м. Москва, 3-й Самотечний пров., буд. 9
тел/факс +7 (495) 684-43-33