

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПРОСТАЛІН
(PROSTALIN)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: гладкі супозиторії торпедоподібної форми, від темно-коричневого до чорного кольору;

склад: 1 супозиторій містить:

іхтамолу - 0,15 г,

калію йодиду - 0,1 г,

екстракту ромашки рідкого - 0,1 г;

допоміжні речовини: бджолиний віск, цетостеариловий спирт, поліетиленгліколь 400, поліетиленгліколь 4000.

Форма випуску. Супозиторії ректальні.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при доброякісній гіпертрофії передміхурової залози. АТС G04C X10**.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Препарат містить поєднання бактерицидних, антисептичних в'язких природних речовин, дія яких призводить до зменшення набряку передміхурової залози та зменшення затримання сечі.

Фармакокінетика. Всмоктування лікарського засобу із супозиторія через слизову прямої кишки в кровообіг проходить у 2 етапи: виділення лікарського засобу з наповнювача, що супроводжується проникненням препарату через слизову, потім ліки транспортуються через венозні або лімфатичні судини в систему кровообігу. Простата тісно межує з прямою кишкою. Тому будь-яка кількість лікарських засобів, які всмоктуються або проникають у простату, чинитиме пряму дію на тканину залози.

Фармакокінетика комбінованого лікарського засобу не вивчалася.

Показання для застосування. Доброякісна гіпертрофія передміхурової залози; простатит.

Спосіб застосування та дози. Дорослим вводять ректально; рекомендована доза 2 рази на добу (вранці та ввечері) по 1 супозиторію. Звичайний курс лікування становить 4 тижні, але може бути продовжений до 6 тижнів.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.

Передозування. Не відмічене.

Особливості застосування. Вводити після останньої клізми або останнього випорожнення кишечника.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Немає даних щодо взаємодії з лікарськими засобами.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі 15-25°C, в недоступному для дітей місці. Термін придатності - 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 5 супозиторіїв в стрипі, по 1 стрипу у картонній коробці.

Виробник. Фарко.

Адреса. Р.О. Вох № 12 Sidi Gaber, Александрія, Єгипет.