

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЕКТЕРИЦИД
(Ectericid)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовтого кольору зі специфічним запахом (рН = 2,8– 3,2; кислотне число – 1,5; щільність – 1,005 – 1,007);

склад: водорозчинні продукти переробки риб'ячого жиру в розчині натрія хлорида ізотонічного 0,9%.

Форма випуску. Розчин для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні засоби. Код АТС D08AX 10**.

Фармакологічні властивості. Препарат має антибактеріальну активність щодо піогенної мікрофлори: синьогнійної та кишкової паличок, протееу, стафілококів. Препарат малотоксичний.

Показання для застосування Лікування післяопераційних та травматичних ран, ускладнених гнійною інфекцією, ран, що повільно гранулюють та довго не загоюються, фурункулів, карбункулів, норицевих форм остеомиєліту, опіків, трофічних виразок з нагноєнням.

Спосіб застосування та дози. Ектерицид застосовують місцево в нерозведеному вигляді як засіб монотерапії чи в комплексі з іншими препаратами.

Лікування інфікованих ран здійснюється шляхом промивання їх Ектерицидом з наступним накладанням марлевих серветок, змочених препаратом. Промивання слід проводити 2 рази на добу до зникнення гнійного виділення, після чого промивання та перев'язки роблять 1 раз в 3 – 4 дні до повного загоювання ран.

При лікуванні інфікованих опіків відкритим способом Ектерицид застосовують з новокаїном: до 50 мл препарату додають 10 мл 0,5 % розчину новокаїну. Ранову поверхню зрошують кожні 6 – 8 годин. При закритому способі 2 рази на добу з інтервалом 6 – 8 годин на опікову поверхню накладають пов'язки, сильно змочені препаратом. Ектерицидом зрошують нижній шар пов'язки, не знімаючи її. Зазначені маніпуляції проводять до повного зникнення гною.

При остеомиєлітах після секвестротомії (секвестректомії) рану пухко тампують марлевими серветками, сильно змоченими Ектерицидом. Рани перев'язують кожні 3 – 4 дні. Лікування карбункулів та фурункулів після їх розтину та евакуації гнійних мас проводять шляхом накладання на рану рясно змочених препаратом марлевих серветок. Перші 2 – 3 дні перев'язки роблять щодня, а далі 1 раз в 2 – 3 дні.

Побічна дія. Не встановлена.

Протипоказання. Відсутні.

Передозування. Не описане.

Особливості застосування. Не допускати потрапляння препарату в очі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Невідома.

Умови та термін зберігання. Зберігають при температурі від 2 °С до 8 °С. Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 мл або 250 мл у пляшках, кожна пляшка в пачці з картону.

Виробник. ЗАТ "Біолік".

Адреса. 61070, Україна, м. Харків, Помірки.