

**І Н С Т Р У К Ц І Я**  
**для медичного застосування препарату**  
**ЕСКУЛЮС КОМПОЗИТУМ**  
**(AESCULUS COMPOSITUM)**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** від прозорого до опалесцентного, світло-жовтого кольору розчин, із запахом спирту етилового;

**склад:** 100 г препарату містять: Aesculus hippocastanum D1 – 10 г, Secale cornutum D3 – 1 г, Viscum album D2 – 1 г, Nicotiana tabacum D10 – 1 г, Solanum nigrum D6 – 1 г, Arnica montana D3 – 1 г, Echinacea D2 – 1 г, Baptisia tinctoria D4 – 1 г, Toxicodendron quercifolium D4 – 1 г, Cuprum metallicum D13 – 1 г, Ruta graveolens D4 – 1 г, Solanum dulcamara D4 – 1 г, Colchicum autumnale D4 – 1 г, Barium iodatum D6 – 1 г, Hamamelis virginiana D4 – 1 г, Apis mellifica D4 – 1 г, Acidum benzoicum e resina D4 – 1 г, Eupatorium cannabinum D3 – 1 г, Arteria suis D10 – 1 г, Natrium puvucicum D8 – 1 г;

**допоміжні речовини:** спирт етиловий, вода очищена.

Препарат містить 35 % об. спирту етилового.

1 мл препарату містить 21 краплю.

**Форма випуску.** Краплі для перорального застосування.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.** *Фармакодинаміка.* Препарат нормалізує стан венозного кровообігу та мікроциркуляцію. Дія препарату базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

*Фармакокінетика.* Для гомеопатичних препаратів не визначається.

**Показання для застосування.** Порушення периферичного кровообігу: діабетична ангіопатія судин нижніх кінцівок II-III ступеня, варикозне розширення вен, у тому числі гемороїдальних вузлів, облітеруючий ендартеріїт нижніх кінцівок та їх гангренозний стан, постінсультні та постінфарктні стани, пролежні, дисциркуляторна енцефалопатія.

**Спосіб застосування та дози.** Разова доза: дорослим – по 10 крапель 3 рази на добу за

15 – 20 хвилин до їди або через годину після. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу капати під язик). При нападі болю у нижніх кінцівках, який супроводжується кульгавістю, разову дозу рекомендується приймати кожні 15 хвилин до покращання стану, але не більше ніж

2 години. Далі перейти на прийом 3 рази на день.

Курс лікування: 4 – 6 тижнів. При необхідності через 2 – 3 тижні курс лікування повторюють.

**Побічна дія.** Не відома.

**Протипоказання.** Препарат не застосовувати вагітним жінкам, а також пацієнтам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

**Передозування.** Не відмічалось.

**Особливості застосування.** Препарат має компонент, що містить йод, тому при підвищеній функції щитовидної залози (тиреотоксикозі) питання про доцільність застосування препарату вирішується індивідуально. Препарат звичайно добре переноситься, але в окремих випадках можливі прояви гіперчутливості до будь-якого з його компонентів (почервоніння та висипи на шкірі). Питання про доцільність застосування препарату жінками, які годують груддю, вирішується індивідуально.

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого можна змінювати тривалість курсу лікування та частоту прийому (до 1 – 2 разів на добу).

Досвід застосування у дітей відсутній.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Сумісний з іншими препаратами.

**Умови та термін зберігання.** Флакон зберігати у зовнішній картонній пачці при температурі від 15 °С до 25 °С.

**Зберігати в місцях, недоступних для дітей!**

Термін придатності – 5 років.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** Картонна пачка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

**Назва фірми-виробника.** Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ.

**Адреса.** Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.