

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕПІГЕН-ІНТИМ
(Epigen-Intim)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: Glycyrrhizinic acid;

основні фізико-хімічні властивості: розчин жовтого кольору, з характерним запахом;

склад: 1 г спрею містить 0,1 мг кислоти гліциризинової;

допоміжні речовини: кислота малеїнова, кислота фумарова, кислота аскорбінова, кислота фолієва, полісорбат, пропіленгліколь, вода очищена.

Форма випуску. Спрей.

Фармакотерапевтична група. Противірусні засоби. Код АТС D06B B.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Діючою речовиною препарату Епіген-інтим є гліциризинова кислота, що видобувається шляхом екстракції з рослинної сировини (коренню солодки).

Кислота гліциризинова має комплексну дію, що включає імуностимулюючу, противірусну, протизапальну та регенераторну дію.

Імуностимулюючий ефект проявляється збільшенням числа та активності Т-лімфоцитів, зменшенням концентрації імуноглобуліну G і збільшенням концентрації імуноглобуліну A та імуноглобуліну M.

Кислота гліциризинова індукуює утворення інтерферону, що є одним з компонентів її противірусної дії.

Кислота гліциризинова має противірусну дію проти різних типів РНК- та ДНК-вмісних вірусів *in vitro* та *in vivo* (*Varicella Zoster*, вірус простого герпесу I та II типів, цитомегаловірус, різні типи вірусу папіломи людини).

Кислота гліциризинова перериває реплікацію вірусів на ранніх стадіях, зумовлює вихід віріону з капсиду тим самим запобігаючи його проникненню в клітини.

Кислота гліциризинова інактивує зазначенні віруси в нетоксичних для нормально функціонуючих клітин концентраціях. Мутантні штами вірусів, що резистентні до ацикловіру та йодоуридину, мають таку ж чутливість до кислоти гліциризинової, як і не мутантні штами.

Фармакокінетика. При зовнішньому та інтравагінальному застосуванні гліциризинова кислота депонується у поверхневих (епідермальних) шарах слизової оболонки та шкіри. Системна абсорбція відбувається повільно. Виявляється в крові у залишкових кількостях.

Показання для застосування. Лікування герпетичної інфекції, викликаной вірусом простого герпесу як при гострому первинному, так і при рецидивному перебігу; запобігання рецидивам герпетичної інфекції лікування оперізувального лишая; лікування папіломовірусної інфекції; у складі комбінованої терапії неспецифічного кольпіту і вагініту; профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом. Препарат може застосовуватися в період ремісії для підтримуючої терапії та профілактики рецидивів, що дає змогу швидко усунути маніфестну фазу та прискорити клінічне одужання.

Спосіб застосування та дози. Перед використанням флакон струсити. При застосуванні флакон тримають у вертикальному положенні. При зовнішньому застосуванні жінки і чоловіки наносять препарат на всю уражену поверхню на відстані 4 – 5 см шляхом повторного натискання клапана пульверизатора.

Рекомендації для жінок. Для інтравагінального застосування препарату додається спеціальна насадка. І порожниста трубка довжиною 7 см, на одному із кінців якої знаходиться розпилювач, на іншому – клапан. Перед застосуванням препарату промити насадку проточною водою з милом. Зняти клапан з флакону пульверизатора і одягнути клапан насадки. Потім насадка вводиться у вагіну в положенні лежачи на

Сторінка 2 з 2. Видавець: Державний експертний центр МОЗ України
спині. Препарат упорскується шляхом 3 – 4 натискувань клапану насадки. Після застосування необхідно залишатись в положенні лежачи 5 – 10 хвилин. Потім насадку знімають з флакона і промивають проточною водою з милом. Насадку зберігають у поліетиленовій упаковці, що додається.

Рекомендації для чоловіків. При застосуванні чоловіками, крім зовнішнього нанесення, препарат упорскується в зовнішній отвір сечовивідного каналу 1 – 2 натисканнями клапана пульверизатора на відстані 0,5 – 1 см.

Дозування для дітей віком від 1 року відповідає дозуванню для дорослої людини.

Побічна дія. Місцеві алергійні реакції (почервоніння, свербіж).

Протипоказання. Підвищена чутливість до одного з компонентів препарату.

Не рекомендується застосовувати дітям до 1 року. I триместр вагітності.

Передозування. Не описано.

Особливості застосування. Для ефективної дії не потрібне попереднє промивання ділянки нанесення; випадку появи ознак непереносимості застосування препарату припинити. У періоди вагітності та лактації застосовується тільки у випадках, коли користь від застосування перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Виявлений синергізм при одночасному застосуванні кислоти гліциризинової та інших протівірусних засобів, зокрема похідних ацикловіру. Під час проведення курсу лікування вірусної інфекції препаратом Епіген-Інтим не рекомендується застосування інтерферонів.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі до 20°C у місці, недоступному для дітей.

Термін придатності - 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 60 мл спрею в пластиковому флаконі, в картонній упаковці.

Виробник. Хемінова Інтернаціональ, С.А.,

Адреса. Макарена, 14, 28016, Мадрид, Іспанія.