

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

Евкабал[®] сироп
(Eucabal[®] syrup)**Загальна характеристика:**

основні фізико-хімічні властивості: прозора темно-коричнева сиропоподібна рідина з характерним запахом;

склад: 100 г сиропу містять: екстракту рідкого подорожника гостролистого 3 г, рідкого екстракту чебрецю (тим'яну) 15 г;

допоміжні речовини: глюкоза, фруктоза, сахароза в рівних кількостях, як розчин інвертного цукру, метил-4-гідроксибензоат, пропіл-4-гідроксибензоат, етанол 6,5 об. %, вода очищена.

Форма випуску. Сироп.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлю та застудних захворюваннях. Код АТС R05C A10.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Терапевтична ефективність препарату Евкабал[®] сироп обумовлена дією чебрецю (тим'яну) та подорожника, що потенціюють один одного.

Екстракт чебрецю, завдяки наявності в його складі фітонцидів та фенолів (тимолу та карвакролу), має бактерицидну дію відносно кокової мікрофлори та бактеріостатичну відносно грамнегативних бактерій. Крім того, феноли мають певну активність до антибіотикорезистентної мікробної флори, в тому числі до L-форм та грибів. Мінімальний вміст фенолів у розчині забезпечує антибактеріальну та протигрибкову дію, що дуже важливо під час тривалого лікування антибіотиками.

Відхаркувальна та секретолітична дії ефірної олії та флавоноїдів чебрецю обумовлені ферментуванням густого в'язкого секрету та підвищенням рухливої активності війчастого епітелію. Здебільшого ефект залежить від властивості поверхнево активної ефірної олії змінювати колоїдний стан мокротиння. Спазмолітичний ефект флавоноїдів забезпечує помірну бронходилатацію, полегшення дихання, особливо його експіраторної фази.

Рослинні муцини подорожника сприяють захисту ушкодженої слизової оболонки бронха від подразнення. При атрофічному ураженні трахеї та бронхів зменшується сухий, непродуктивний кашель. Фармакологічна дія фітонцидів та фенолів полягає в розрідженні та розчиненні бронхіального секрету, посиленому його виведенні війчастим епітелієм, послабленні катаральних проявів у респіраторних шляхах, у протимікробній дії та захисті слизової оболонки від подразнення.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. Симптоматичне лікування кашлю будь-якого походження. Запальні захворювання дихальних шляхів (гострі та хронічні ларингіти, фарингіти, трахеїти, бронхіти, бронхіоліти тощо).

Будь-які подразнення (механічні, хімічні та ін.) дихальних шляхів, в тому числі бронхіт курців, професійний ларингіт.

Спосіб застосування та дози. Дітям віком з 6 місяців до 6 років призначають по 1 чайній ложці (5 мл) 3 - 5 разів на добу.

Дітям від 6 до 12 років – по 1 десертній ложці (10 мл) 3 - 5 разів на добу.

Дітям старше 12 років і дорослим призначають по 1 - 2 десертні ложки (10 - 20 мл) 3 - 5 разів на добу.

Тривалість приймання – 1 - 3 тижні.

Побічна дія. В окремих випадках можливі алергічні реакції (кропив'янка, свербіж шкіри).

Протипоказання. Непереносимість фруктози; підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 6 місяців.

Передозування. При передозуванні може з'явитися нудота, що супроводжується підкашлюванням. Лікування симптоматичне.

Особливості застосування. Перед застосуванням необхідно збовтати флакон із сиропом.

Наявність у препараті складових частин рослинного походження може спричинити помутніння сиропу, однак, терапевтична ефективність препарату від цього не зменшується.

В препараті Евкабал® сироп міститься 6,5 об. % етанолу.

Вказівка для хворих на діабет

Евкабал® сироп містить глюкозу, фруктозу і сахарозу із загальним вмістом цукру в перерахуванні на сахарозу 0,6 г/мл. Таким чином, в 1 чайній ложці (5 мл) міститься 3 г сахарози або 0,25 хлібних одиниць, а в 1 столовій ложці (10 мл) – 6 г сахарози або 0,5 хлібних одиниць.

Вагітність і лактація.

Застосування препарату можливо лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Допоки взаємодія з іншими речовинами не спостерігалась.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 С. Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 100 мл сиропу у скляному флаконі.

Виробник. Еспарма ГбмХ, Німеччина (esparma GmbH, Germany).

Адреса. esparma GmbH

Lange Göhren 3

D-39171 Osterweddingen, Germany.

Виробник. Фарма Вернігероде ГмбХ для Еспарма ГмбХ

Pharma Wernigerode GmbH, for esparma GmbH, Germany

Адреса.

Дорнбергсвед, 35, Д-38855 Вернігероде, Німеччина

Dornbergswed, 35, D-38855, Wernigerode, Germany