

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ЕЛЕКАСОЛ
(AELECASOLUM)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: *подрібнена сировина:* суміш шматочків різної форми сіро-зеленого кольору з оранжево-жовтими, білими і коричневими краплями, що проходять крізь сито з отворами діаметром 5 мм; запах ароматний;
порошок крупний: суміш шматочків різної форми сіро-зеленого кольору з оранжево-жовтими, білими і коричневими краплями, що проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм; запах ароматний;
склад: 1 г збору містить: череди трава - 0,1 г, ромашки квітки - 0,1 г, солодки корені - 0,2 г, шавлії листя - 0,2 г, евкалипта прутовидного листя - 0,2 г, календули квітки - 0,2 г.

Форма випуску. Збір.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні засоби. Код АТС D08A X10**.

Фармакологічні властивості. Компоненти збору містять олію ефірну, флавоноїди, кумарини, полісахариди, кислоти органічні, солі мінеральні, каротин, кислоту аскорбінову, речовини дубильні, гіркоти, смоли. Цей комплекс біологічно активних речовин має антимікробну дію відносно стафілокока, кишкової та синьогнійної паличок, вульгарного протей, пухнастого мікроспоруму та деяких інших мікроорганізмів, виявляє протизапальні властивості і стимулює репаративні процеси.

Показання для застосування. У комплексній терапії гострих і хронічних захворювань вуха, горла та носа; запальні захворювання ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту.

Спосіб застосування та дози. 10 г (2 столові ложки) збору вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. Застосовують місцево для полоскання, примочок, мікроклізм, зрошень та інгаляцій у розведеному вигляді (розводять водою у 3-4 рази). Внутрішньо дорослі приймають по 1/3 склянки нерозведеного настою 3 рази на день за 30 хв до їди. Діти, залежно від віку – від 1 столової ложки до 1/4 склянки 3 рази на день за 30 хв до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

2 фільтр-пакети вміщують в скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хв. Дорослі приймають у теплу вигляді по 1 склянці 3 рази на день за 30 хв до їди. Діти, залежно від віку – 1/4-1/2 склянки 3 рази на день за 30 хв до їди. Настій застосовують місцево для полоскання, примочок, мікроклізм, зрошень та інгаляцій.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Побічна дія. Іноді можуть спостерігатися реакції місцевого та загального характеру, зумовлені підвищеною чутливістю до препарату. При появі побічних реакцій припинити прийом препарату.

Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарському засобі.

Передозування. Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Особливості застосування. Вагітним і жінкам, які годують груддю, застосування препарату лише у випадку, коли, на думку лікаря, користь від застосування переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Невідома.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – у прохолодному (8-15°C) місці не більше 2 діб.

Термін придатності - 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Подрібнена сировина по 60 г, 75 г у пачках з внутрішнім пакетом, порошок крупний по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20.

Виробник. ЗАТ “Ліктрави”.

Адреса. Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.