

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ОФТОЛІК
(OPHTOLIQUE)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний або злегка жовтуватий розчин;

склад: 1 мл розчину містить спирту полівінілового- 14 мг, повідону – 6 мг;

допоміжні речовини: бензалконію хлорид, динатрію едетат, натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Форма випуску. Краплі очні.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються в офтальмології. АТС S01X A20.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Офтолїк - препарат, що чинить захисну дію на рогівку ока при зниженні секреції слізної рідини, забезпечує необхідний зволожуючий ефект, тривало контактує з рогівкою ока. Основний компонент - полівініловий спирт, має властивості, подібні до властивостей муцину (речовини, що продукується кон'юктивою ока). В комбінації з повідоном забезпечує посилення ефекту змашування, що приводить до зменшення подразнення та сухості поверхні ока. Потовщення слізної плівки забезпечує заспокійливу дію на око у випадку зміни властивостей муцину, наприклад при простудних захворюваннях, бактеріальних, грибкових і запальних ураженнях очей. Захисна функція потовщеного шару слюзи особливо помітна при травмах і ерозіях кон'юктиви і рогівки.

Фармакокінетика. При застосуванні не чинить системної дії.

Показання для застосування.

Сухий кератокон'юнктивіт та інші захворювання, що супроводжуються синдромом «сухого ока».

Спосіб застосування та дози. Призначають кон'юнктивально дорослим та дітям старше 7 років по 1-2 краплі в одне око 3-4 рази на день. Курс лікування звичайно становить 14-21 день. Повторні курси лікування, зміна тривалості курсу встановлюється лікарем.

Побічна дія.

Відразу після закапування можливе короточасне затуманювання зору, відчуття поколювання і місцеве подразнення очей, алергічна реакція.

Протипоказання. Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату, дитячий вік до 7 років.

Передозування. Даних щодо передозування не надходило.

Особливості застосування.

Застосування препарату в період вагітності та лактації. Не вивчено. Застосування можливо, якщо сприятлива дія на матір перевищує ризик для плоду або дитини.

Вплив на здатність керувати автомобілем та роботу з механічними приладами. Оскільки відразу після закапування можливе короточасне зниження гостроти зору, перед початком управління автомобілем чи роботою з механізмами необхідно почекати, поки гострота зору повністю відновиться.

Під час лікування не слід носити м'які контактні лінзи. Перед застосуванням очних крапель тверді контактні лінзи необхідно видалити і знову установити не раніше чим через 20 хвилин.

Якщо призначено більше одного виду очних крапель, їх необхідно застосовувати з інтервалом мінімум 15–20 хвилин, при цьому Офталік завжди закапують в останню чергу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Пролонгує усмоктування інших очних препаратів (адреноміметиків, антибіотиків, бета – адреноблокаторів, кортикостероїдів і інш.).

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморозувати! Термін придатності - 2 роки. Після першого відкриття термін придатності – 1 місяць.

Умови відпуску. Без рецепту.

Упаковка. По 5 мл або 10 мл у флакон-крапельницю, №1 у пачку.

Виробник. ПРОМЕД ЕКСПОРТС Пвт. Лтд., Індія

Адреса. 212, Аширвад Комерціал Комплекс, Д-1, Грін Парк, Нью –Делі-110016, Індія.