

**І Н С Т Р У К Ц І Я**  
для медичного застосування препарату

**М Е Н О В А З И Н**  
(MENOVASINUM)

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** Прозора безбарвна рідина з запахом ментолу;

**склад:** 100 мл розчину містять ментолу рацемічного – 2,5 г, новокаїну - 1 г, анестезину - 1 г;

**допоміжні речовини:** спирт етиловий 70%.

**Форма випуску.** Розчин спиртовий.

**Фармакотерапевтична група.** Протисвербіжні засоби (включаючи антигістамінні місцево-анестезуючі засоби). АТС D04A X.

**Фармакологічні властивості.** Має властивість викликати зворотне порушення збудливості і провідності нервових рецепторів і провідників при безпосередньому контакті з ними, має подразнювальну і відволікаючу дію (ментол), в основі якої лежить інтерференція збудження нервових центрів і перебудова больової домінанти. Пригнічує збудження мембран нервового волокна, знижує амплітуду потенціалу дії, підвищує поріг деполяризації мембрани нервового волокна, уповільнює швидкість розвитку висхідної фази потенціалу дії, знижує ступінь збудження в нервових елементах.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

**Показання для застосування.** Місцевоанестезуючий засіб при невралгіях, міалгіях, артралгіях; як протисвербіжний засіб при сверблячих дерматозах.

**Спосіб застосування та дози.** Для розтирання болісних ділянок м'язів та суглобів 2 - 3 рази на день.

Курс лікування залежить від форми перебігу захворювання, а також від характеру супутньої терапії.

**Побічна дія.** При тривалому застосуванні можливі запаморочення, загальна слабкість, зниження артеріального тиску

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Передозування.** Можуть розвиватися алергічні реакції шкіри (дерматити, лущення шкіри).

**Лікування.** При появі симптомів алергії препарат відмінити.

**Особливості застосування.** Не наносити на шкіру з проявами алергічної реакції. Досвіду застосування Меновазину у вагітних жінок, у період лактації і у дітей раннього віку немає.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Застосовувати одночасно з іншими місцеводіючими препаратами не рекомендується.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати в прохолодному та недоступному для дітей місці. Термін придатності - 2 роки.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** Флакони по 40 мл. По 30 флаконів в упаковці.

**Назва виробника.** ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"

**Адреса.** 10014, Україна, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5