

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
МАТИ-Й-МАЧУХИ ЛИСТЯ
(FARFARAE FOLIA)

Загальна характеристика:

міжнародна назва: Tussilago farfara;

основні фізико-хімічні властивості: шматочки циліндричної форми, діаметром 5 мм, довжиною 8-12 мм. Поверхня гладенька, блискуча, зрідка матова, мармурова, на торцях нерівна. Колір темно-зелений з світлішими вкрапленнями, на торцях світліший. Запах слабкий, характерний. Смак злегка гіркуватий з відчуттям слизистості;

склад: мати-й-мачухи листя.

Форма випуску. Листя різано-пресоване.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код АТС: R05C A20**.

Фармакологічні властивості. Листя мати-й-мачухи містять глікозиди гіркі, флавоноїди, ситостерин, сапоніни, каротиноїди, кислоти органічні, дубильні речовини, вітамін С. Цей комплекс біологічно активних речовин має відхаркувальну, протизапальну, пом'якшувальну, м'яку потогінну і слабку спазмолітичну дію. Настой із листя мати-й-мачухи відновлюють активність війчастого епітелію трахеї і бронхів, сприяють розрідженню і відходженню мокроти, виявляють обволікаючу дію на слизові оболонки порожнини рота та гортані, захищаючи їх від подразнення.

Показання для застосування. Захворювання дихальних шляхів (ларингіти, трахеїти, хронічні бронхіти, бронхопневмонії, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба).

Спосіб застосування та дози. 5 г (1 чайна ложка) листя різано-пресованого вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі приймають у теплому вигляді по 1/3-1/2 склянки 2-3 рази на день за 1 годину до їди або по 1 столовій ложці 4-6 разів на день. Діти, залежно від віку – від 1 столової ложки до 1/4 склянки 2-3 рази на день за 1 годину до їди.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Побічна дія. При індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можливий розвиток алергічних реакцій (гіперемія, висипання, свербіж та набрякання шкіри). При появі побічних реакцій припинити прийом препарату.

Протипоказання. Індивідуальна чутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарському засобі.

Передозування. Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Особливості застосування. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Невідома.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Приготований настій – у прохолодному (8-15 °С) місці, не більше 2 діб.

Термін придатності - 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Виробник. ЗАТ “Ліктрави”.

Адреса. Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.