

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
РЕНДЕСМОЛ
(RENDESMOL)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: таблетки довгастої форми, коричневого кольору, вкриті оболонкою, гладкі з обох боків;

склад: 1 таблетка містить екстракту десмодіуму стирасифоліуму (*Desmodium Styracifolium*) 200 мг;

допоміжні речовини: крохмаль пшеничний, лактоза, магнію стеарат, сахароза, шелак, гуміарабік, полівінілацетат, титану діоксид, тальк, заліза оксид червоний, заліза оксид чорний, віск карнаубський, парафін твердий.

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в урології. Код АТС G04B X.

Фармакологічні властивості.

Фармакокінетика. Десмодіум стирасифоліуму, належить до сімейства Fabaceae. Згідно з досвідом східної народної медицини десмодіум стирасифоліум застосовується для видалення конкрементів жовчного та сечового міхурів, конкрементів у сечоводі, а також набряків, при захворюваннях нирок та порушеннях травлення.

Екстракт десмодіуму стирасифоліуму має діуретичну, жовчогінну, протизапальну, судинорозширювальну, гіпотензивну дію. Під дією препарату оксалати кальцію вимиваються сечею, це знижує їхню кількість і запобігає збільшенню розмірів каменів, що формуються в нирках і в ниркових протоках. Крім того, екстракт десмодіуму стирасифоліуму, завдяки своїм протизапальним властивостям, зменшує прояви інфекцій сечовивідних шляхів, запалення і ниркові набряки; створює сприятливі умови для виведення каменів; полегшує симптоми болісного і частого сечовипускання, зменшує набряки.

Рендесмол рекомендується при лікуванні каменів з оксалату кальцію.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. Сечокам'яна та жовчокам'яна хвороби. Лікування пієлонефриту та холециститу.

Спосіб застосування та дози. Дорослим призначають внутрішньо по 2 - 3 таблетки 2 - 3 рази на добу після їди, запиваючи великою кількістю води. Курс лікування визначається для кожного пацієнта лікарем індивідуально і становить не більше 6 місяців.

Побічна дія. Не встановлено.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки. Вагітність і лактація. Дитячий вік.

Передозування. Не виявлено.

Особливості застосування. При гастритах препарат рекомендується приймати після прийому їжі. Пацієнтам з недостатністю лактози, галактоземією або галактозним синдромом мальабсорбції слід з обережністю приймати препарат, оскільки Рендесмол містить 0,125 г молочного цукру. У кожній призначеній дозі міститься до 0,25 г молочного цукру.

Пацієнтам з вродженою непереносимістю фруктози, глюкозним синдромом мальабсорбції або цукрово/ізомальтазним дефіцитом слід з обережністю приймати препарат, оскільки він містить 0,0408 г сахарози. У кожній призначеній дозі міститься до 0,0816 г сахарози.

Оскільки досвід застосування препарату у дітей відсутній, його не слід призначати у дитячому віці.

Немає даних про негативний вплив на керування автотранспортними засобами та працювати зі складними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, сухому місці при температурі не вище 25 С. Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 100 таблеток у пластмасовому флаконі, в картонній коробці.

Виробник. Акціонерна фармацевтична компанія «Хау Занг».

Адреса. 288, вул. Біс НГУЕН Ван Ку, місто Кан-То, В'єтнам.