

**И Н С Т Р У К Ц И Я**  
**по медицинскому применению препарата**  
**АРФАЗЕТИН**  
**(ARPHASETINUM)**

**Общая характеристика:**

**основные физико-химические свойства:** *измельченное сырье:* смесь неоднородных кусочков серовато-зеленого цвета со светло-желтыми, серовато-бурыми, кремовыми, желтовато-серыми, оранжево-красными, буровато-красными, бурыми и белыми включениями, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 5 мм; запах слабый, ароматный;

*порошок крупный:* смесь неоднородных кусочков серовато-зеленого цвета со светло-желтыми, серовато-бурыми, кремовыми, желтовато-серыми, оранжево-красными, буровато-красными, бурыми и белыми включениями, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм; запах слабый, ароматный;

**состав:** 1 г сбора содержит: черники обыкновенной побегов - 0,2 г, фасоли обыкновенной створок плодов - 0,2 г, элеутерококка колючего корневищ и корней - 0,15 г, шиповника плодов - 0,15 г, хвоща полевого травы - 0,1 г, зверобоя травы - 0,1 г, ромашки цветков - 0,1 г.

**Форма выпуска.** Сбор.

**Фармакотерапевтическая группа.** Антидиабетические препараты. Код АТС А10ХХ\*\*.

**Фармакологические свойства.** Компоненты сбора содержат масло эфирное, флавоноиды, кумарины, полисахариды, соли минеральные, кислоты органические, вещества дубильные, алкалоиды, вещества смолистые и горькие. Этот комплекс биологически активных веществ обладает гипогликемическим эффектом при сахарном диабете II типа, что дает возможность в ряде случаев снизить суточные дозы пероральных антидиабетических средств, повышает толерантность к углеводам. При сахарном диабете I типа заметного гипогликемического влияния не отмечено.

**Показания к применению.** Сахарный диабет II типа легкой и средней тяжести, как самостоятельно, так и в составе комплексной терапии.

**Способ применения и дозы.** 5 г (1 десертная ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, остаток отжимают к процеженному настою. Объем настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают в теплом виде по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза в день за 30 мин до еды в течение 20-30 дней. Дети, в зависимости от возраста, - от 1 десертной ложки до 1/4 стакана 2-3 раза в день за 30 мин до еды в течение 20-30 дней. Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают и настаивают 15 мин. Взрослые принимают в теплом виде по 1 стакану 2 раза в день за 30 мин до еды в течение 20-30 дней. Дети, в зависимости от возраста, - от 2 десертных ложек до 1/2 стакана 2-3 раза в день за 30 мин до еды в течение 20-30 дней.

Через 10-15 дней курс лечения рекомендуется повторить. В течение года проводят 3-4 курса.

**Побочное действие.** Не выявлено.

**Противопоказания.** Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату.

**Передозировка.** Сообщений о передозировке препарата не поступало.

**Особенности применения.** Беременным и женщинам, кормящим грудью, применение препарата только в случае, если, по мнению врача, польза от применения превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** В комплексной терапии может способствовать снижению доз пероральных антидиабетических препаратов.

**Условия и сроки хранения.** Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте. Приготовленный настой - в прохладном (8-15 С) месте не более 2 суток.

Срок годности - 2 года.

**Условия отпуска.** Без рецепта.

**Упаковка.** Измельченное сырье по 75 г, 100 г в пачках с внутренним пакетом, порошок крупный по 1,5 г в фильтр-пакетах № 20.

**Производитель.** ЗАО "Лектравы".

**Адрес.** Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.