И Н С Т Р У К Ц И Я
по медицинскому применению препарата
ЛИПЫ ЦВЕТКИ
(TILIAE FLORES)

Общая характеристика:
международное название: Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop.;
основные физико-химические свойства: *измельченное сырье*: смесь цветков, цветоножек и кусочков прицветников различной формы, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 10 мм. Цвет лепестков беловато-желтый, чашелистиков - зеленовато- или желтовато-серый, прицветных листьев - светло-желтый или зеленовато-желтый. Запах слабый, ароматный. Вкус сладковатый, слегка вяжущий, с ощущением слизистости;
порошок крупный: кусочки цветков, цветоножек и прицветников различной формы, прохо-дящие сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. Цвет зеленовато- или желтовато-серый, беловато-желтый, зеленовато-желтый, светло-желтый. Запах слабый, ароматный. Вкус сладковатый, слегка вяжущий, с ощущением слизистости;
состав: липы цветки.

Форма выпуска. Цветки.

Фармакотерапевтическая группа. Антисептические средства. Код АТС R02A A20.

Фармакологические свойства. Цветки липы содержат масло эфирное, гликозиды гесперидин и тилиацин, сапонины, вещества дубильные, слизи, каротин, кислоту аскорбиновую, сахара. Этот комплекс биологически активных веществ оказывает противо-воспалительное, жаропонижающее, противомикробное, мягкое успокаивающее действие. Препараты из цветков липы повышают потоотделение и диурез, усиливают секрецию желудочного сока, увеличивают желчеобразование и облегчают поступление желчи в двенадцатиперстную кишку.

Показания к применению. Внутрь применяют при простудных заболеваниях, бронхитах.
Наружно - при ангинах, стоматитах, ларингитах, гингивитах.

Способ применения и дозы. 10 г (2 столовые ложки) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, остаток отжимают к процеженному настою. Объем настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают в теплом виде по 1/2-1 стакану 2-3 раза в день после еды. Дети, в зависимости от возраста – от 1 столовой ложки до 1/3 стакана 2-3 раза в день после еды. Наружно используют для полосканий полости рта и зева 3-4 раза в день. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

3 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают и настаивают 15 мин. Взрослые принимают в теплом виде по 1 стакану 2-3 раза в день после еды. Дети, в зависимости от возраста – от 2 столовых ложек до 1/2 стакана 2-3 раза в день после еды. Наружно используют для полосканий полости рта и зева 3-4 раза в день.

Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально с учетом характе-ра, степени тяжести и особенностей течения заболевания, устойчивости достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

Побочное действие. При индивидуальной повышенной чувствительности к препарату возможно развитие аллергических реакций (гиперемия, сыпь, зуд и отекание кожи). При появлении побочных реакций прекратить прием препарата.

Противопоказания. Индивидуальная чувствительность к биологически активным веществам, содержащимся в лекарственном средстве.

Передозировка. Сообщений о передозировке препарата не поступало.

Особенности применения. Беременным и женщинам, кормящим грудью, применение препарата только в случае, если, по мнению врача, польза от применения превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Неизвестно.

Условия и срок хранения. Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте. Приготовленный настой - в прохладном (8-15 °С) месте не более 2 суток.
Срок годности - 2 года.

Порядок отпуска. Без рецепта.

Упаковка. Измельченное сырье по 50 г в пачках с внутренним пакетом, порошок крупный по 1,5 г в фильтр-пакетах № 20.

Производитель. ЗАО “Лектравы”.

Адрес. Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com