

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЕКСАЛІЗ
(HEXALYSE)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: сублінгвальні оранжево-рожеві таблетки круглої форми із смаком лимону;

склад: 1 таблетка містить біклотимолу 5 мг, лізоциму 5 мг, еноксолону 5 мг;

допоміжні речовини: олія лимонна ефірна, кислоти лимонної моногідрат, барвник харчовий жовто-оранжевого кольору S (E 110), магнію стеарат, гуміарабік, цукрова глазур.

Форма випуску. Таблетки для розсмоктування.

Фармакотерапевтична група. Препарати для місцевого застосування в оториноларингології, стоматології. Код АТС R02A.

Фармакологічні властивості. Комбінований препарат, що проявляє тривалий місцевий ефект. Антисептична, анальгезуюча, протизапальна, очищувальна дія препарату зумовлена трьома активними інгредієнтами.

Біклотимол проявляє бактерицидну дію відносно стафілококів, стрептококів, мікрококів та коринебактерій. Коагулює білки мікробної клітини.

Біклотимол і еноксолон зумовлюють протизапальну і анальгезуючу дії препарату.

Лізоцим – природний полімукосахарид проявляє антибактеріальну дію відносно грампозитивних бактерій та антивірусну активність. З іншого боку він підсилює гуморальний імунний та локальний клітинний захист. Інгібуючи гістамін, лізоцим бере участь у протизапальній реакції, а також сприяє швидшому видаленню продуктів метаболізму ушкоджених тканин.

Фармакокінетика. Фармакокінетика препарату не вивчена. Препарат всмоктується через слизові оболонки дуже повільно, що забезпечує його тривалу присутність в ротовій порожнині.

Показання для застосування. Місцеве лікування інфекційно-запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота, глотки і гортані: стоматити, гінгівіти, парадонтоз, тонзиліти, фарингіти, ларингіти. Запалення ясенного краю.

Спосіб застосування та дози. Сублінгвально (не розжовуючи, тримати у роті до повного розсмоктування).

Дорослим та дітям старше 15 років: від 6 до 8 таблеток розсмоктувати на добу.

Дітям старше 6 років: від 6 до 8 таблеток розсмоктувати на добу.

Побічна дія. В окремих випадках можливі алергічні реакції.

Протипоказання. Діти до 6 років.

Підвищена чутливість (у тому числі до окремих компонентів).

Передозування. У зв'язку з малою абсорбцією у системний кровотік передозування малоімовірно.

Особливості застосування. Слід запобігати тривалому застосуванню препарату (більше 10 днів), оскільки це може викликати порушення нормальної мікрофлори ротової порожнини з ризиком розвитку стійкої бактеріальної або грибової мікрофлори (кандидози).

Якщо протягом 10 днів лікування препаратом “Гексаліз” стан хворого не покращився, то необхідно провести повне обстеження хворого.

При призначенні препарату хворим на цукровий діабет необхідно враховувати, що в 1 таблетці міститься 1,1 г цукру.

Під час вагітності і лактації Гексаліз призначають тільки за винятковими показаннями.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Взаємодія препарату Гексаліз з іншими препаратами не описана.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі нижче 25 °С у місцях недоступних для дітей. Термін зберігання – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. 30 таблеток в упаковці (по 10 таблеток у блістері).

Виробник. Лабораторії Бушара - Рекордати.

Адреса. 68, вул. Маржолен, 92300 ЛЕВАЛЛУА-ПЕРРЕ ФРАНЦІЯ.