И Н С Т Р У К Ц И Я
по медицинскому применению препарата
РОМАШКИ ЦВЕТКИ
(CHAMOMILLAE FLORES)

Общая характеристика:
международное название: Chamomilla recutita;
основные физико-химические свойства: смесь трубчатых и язычковых цветков, цветолож и их кусочков, реже цельных цветочных корзинок, а также кусочков стеблей и листьев. Цвет от светло-желтого до желтовато-зеленого с белыми вкраплениями. Запах сильный, ароматный. Вкус пряный, горьковатый, слегка слизистый;
состав: ромашки цветки обмолоченные.

Форма выпуска. Цветки.

Фармакотерапевтическая группа. Дерматологические средства. Код АТС D11A X20.

Фармакологические свойства. Цветки ромашки обмолоченные содержат масло эфирное, состоящее из хамазулена, прохамазулена, других монотерпенов и сесквитерпенов, а также флавоноиды, кумарины, полисахариды, соли минеральные, каротин, кислоту аскорбиновую, ситостерин, холин, кислоты органические. Этот комплекс биологически активных веществ оказывает болеутоляющее, противовоспалительное, антисептическое, вяжущее действие. Препараты из цветков ромашки обмолоченных усиливают процессы регенерации тканей.

Показания к применению. Наружно применяют при отеках, фурункулах и других гнойно-воспалительных заболеваниях кожи, потливости ног, воспалительных заболеваниях полости рта и горла.

Способ применения и дозы. 8 г (2 столовые ложки) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаи-вают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, остаток отжимают к процеженному настою. Объем настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Наружно используют для полосканий, примочек, ванночек, ванн.

Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально с учетом характера, степени тяжести и особенностей течения заболевания, устойчивости достигнутого терапев-тического эффекта и переносимости препарата.

Побочное действие. Настой иногда раздражает кожу. При индивидуальной повышенной чувствительности к препарату возможно развитие аллергических реакций (гиперемия, сыпь, зуд и отекание кожи). При появлении побочных реакций прекратить прием препарата.

Противопоказания. Индивидуальная чувствительность к биологически активным веществам, содержащимся в лекарственном средстве.

Передозировка. Сообщений о передозировке препарата не поступало.

Особенности применения. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Неизвестно.

Условия и сроки хранения. Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте. Приготовленный настой - в прохладном (8-15 ^{o}C) месте, не более 2 суток.
Срок годности - 1 год.

Порядок отпуска. Без рецепта.

Упаковка. По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Производитель. ЗАО “Лектравы”.

Адрес. Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com