

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ГЛОДУ ЛИСТЯ І КВІТКИ
(CRATAEGI FOLIA ET FLORES)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: подрібнена сировина: суміш неподрібнених квіток, бутонів, окремих пелюсток, тичинок та їх шматочків, шматочків квітконіжок, листя, черешків з домішками шматочків гілочок різної форми жовтуватого, буруватого, бурувато- або жовтувато-білого, сіро-зеленого, світло-зеленого, зеленого, темно-зеленого, бурувато-зеленого кольору, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм; запах слабкий, своєрідний;

порошок крупний: суміш шматочків листя, квіток, бутонів, пелюсток, квітконіжок, тичинок, черешків різної форми жовтуватого, буруватого, бурувато- або жовтувато-білого, сіро-зеленого, світло-зеленого, зеленого, темно-зеленого, бурувато-зеленого кольору, що проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм; запах слабкий, своєрідний;

склад: глоду листя і квітки.

Форма випуску. Листя і квітки.

Фармакотерапевтична група. Кардіологічні препарати. Код АТС С01Е В04.

Фармакологічні властивості. Листя і квітки глоду містять флавоноїди (гіперозид, кверцетин, вітексин та ін.), каротиноїди, фенолокислоти (кавову, олеанолову, урсолову), аміни (холін, ацетилхолін, триметиламін), ефірну олію, дубильні речовини. Цей комплекс біологічно активних речовин виявляє кардіотонічну, спазмолітичну, гіпотензивну і заспокійливу дію. Настой з листя та квіток глоду покращують роботу серцевого м'яза, усувають порушення ритму серцевих скорочень, посилюють кровообіг у коронарних судинах серця та судинах головного мозку, нормалізують артеріальний тиск, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів, знижують проникність стінок кровоносних судин і капілярів, сприяють зниженню рівня холестерину в крові.

Показання для застосування. Функціональні розлади серцевої діяльності, ангіоневрози; легкі форми аритмій; початкові стадії артеріальної гіпертензії.

Спосіб застосування та дози. 5 г (1 столова ложка) листя і квіток вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі приймають у теплом вигляді по 1/3 склянки 3 рази на день за 15-20 хв до їди. Діти, старше 14 років – по 1/4 склянки 2-3 рази на день за 15-20 хв до їди.

2 фільтр-пакети вміщують у скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хв. Дорослі приймають у теплом вигляді по 1/3 склянки 3 рази на день за 15-20 хв до їди. Діти, старше 14 років – по ¼ склянки 2-3 рази на день за 15-20 хв до їди.

Тривалість курсу лікування залежить від характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту, переносимості препарату і визначається лікарем індивідуально.

Побічна дія. При тривалому застосуванні може з'явитися сонливість, зменшення частоти серцевих скорочень.

Протипоказання. Виражені артеріальна гіпотензія і брадикардія; діти віком до 14 років; вагітність та період лактації; підвищена індивідуальна чутливість до препарату.

Передозування. При передозуванні виникають сонливість, зменшення частоти серцевих скорочень. При виникненні даних симптомів потрібно припинити прийом препарату, терапія симптоматична.

Особливості застосування. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Може посилювати дію снодійних, седативних та антиаритмічних засобів, серцевих глікозидів.

Умови та термін зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – у прохолодному (8-15 °С) місці, не більше 2 діб.

Термін придатності - 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Подрібнена сировина по 50 г і 60 г в пачках з внутрішнім пакетом, порошок крупний по 2,5 г у фільтр-пакетах № 10, № 20.

Виробник. ЗАТ "Ліктрави".

Адреса. Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.