

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛОМЕКСИН
(LOMEXIN)

Склад:

Діюча речовина: фентиконазол;

1 капсула містить фентиконазолу нітрату 200 мг або 600 мг;

допоміжні речовини (для капсул 200 мг): кремнію діоксид колоїдний, тригліцериди насичених жирних кислот, желатин, гліцерин, титану діоксид, натрію етилпарагідроксибензоат, натрію пропілпарагідроксибензоат;

допоміжні речовини (для капсул 600 мг): парафін рідкий, вазелін білий, лецитин соєвий, желатин, гліцерин, титану діоксид, натрію натрію етилпарагідроксибензоат, натрію пропілпарагідроксибензоат.

Лікарська форма.

Капсули вагінальні.

Фармакотерапевтична група.

Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології Похідні імідазолу.

Код АТС G 01A F 12.

Клінічні характеристики.***Показання.***

Кандидози слизової оболонки жіночих статевих органів (вагініти, вульвовагініти, піхвові білі).

Противоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози.***Капсули 200 мг***

Капсулу вводять інтравагінально (глибоко у вагіну) у положенні лежачи, перед сном, одноразово. Курс лікування – 3 дні.

Капсули 600 мг

Капсулу вводять інтравагінально (глибоко у вагіну) у положенні лежачи перед сном, одноразово. Якщо симптоми зберігаються, то через три дні можна ввести ще одну капсулу.

Не припиняти лікування під час менструації. З метою уникнення повторного інфікування рекомендується, щоб партнер у цей самий час користувався препаратом Ломексин крем (наносити на статевий член і крайню плоть).

Побічні реакції.

Ломексин, як правило, добре переноситься шкірою та слизовими оболонками. Після внутрішньовагінального лікування спостерігались лише поодинокі випадки непереносимості препарату - відчуття печіння, яке швидко проходить.

При індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можливі алергічні реакції.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Передозування.

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Застосування в період вагітності і лактації.

Незважаючи на досить низьку вагінальну абсорбцію фентиконазолу, рекомендується уникати застосування препарату під час вагітності.

Особливості застосування.

При використанні презервативів або жіночого контрацептивного ковпачка з латексу на шийку матки виникає ризик розриву презерватива або контрацептивного ковпачка.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Будь-яке вагінальне лікування може інактивувати місцеву контрацепцію.

Фармакологічні властивості.**Фармакодинаміка.**

Синтетичний протигрибковий засіб широкого спектра дії. Препарат активний відносно дерматофітів, дріжджових грибів родини *Candida* і пліснявих грибів, збудників системних мікозів. Препарат чинить антибактеріальну дію відносно грамозитивних мікроорганізмів.

Фармакокінетика. Абсорбція фентиконазолу нітрату із вагіни незначна.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: непрозорі, м'які желатинові капсули від білого кольору до кольору слонової кістки.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати у захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі нижче 25⁰ С.

Упаковка. Вагінальні капсули по 200 мг - 3 капсули в упаковці.

Вагінальні капсули по 600 мг - 1 капсула в упаковці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. Каталент Італі С.п.А.,

Місцезнаходження. Віа Неттуненсе Км 20, 100-04011 Априлія (пров.Латина) Італія.