

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛОМЕКСИН
(LOMEXIN)

Склад:

діюча речовина: фентиконазол;

1 г крему містить фентиконазолу нітрату 20 мг;

допоміжні речовини: пропіленгліколь, ланолін гідрогенізований, олія мигдальна, ефір полігліколевий жирних кислот, спирт цетиловий, гліцерил моностеарат, натрію едетат, вода очищена.

Лікарська форма. Крем.

Фармакотерапевтична група.

Протигрибкові препарати для місцевого застосування. Похідні імідазолу.

Код АТС D01A C.

Клінічні характеристики.

Показання.

Профілактика і лікування грибової, бактеріальної і змішаної інфекції шкіри і слизових оболонок статевих органів.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози.

Ломексин застосовується місцево.

Ломексин слід застосовувати 1-2 рази на добу (залежно від тяжкості захворювання), попередньо вимивши і підсушивши уражену ділянку. Крем наноситься методом легкого втирання або змазування ураженої ділянки, бажано на ніч. У разі необхідності крем можна застосовувати і вранці. Курс лікування залежить від виду мікроорганізму і розміру ураженої ділянки.

З метою уникнути повторного інфікування статевому партнеру у цей самий час потрібно також застосовувати препарат.

Побічні реакції.

При нанесенні крему на уражену ділянку в поодиноких випадках можливе відчуття печіння, яке швидко минає.

Лікування слід припинити в разі виникнення реакції підвищеної чутливості і розвитку резистентності мікроорганізмів.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Передозування. Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Застосування в період вагітності і годування груддю. Незважаючи на досить низьку абсорбцію через шкіру, рекомендується уникати застосування препарату у період вагітності.

Фентиконазолу нітрат в незначній кількості виділяється в материнське молоко. Тому в період годування груддю не рекомендується застосовувати препарат.

Особливості застосування. Застосування препарату протягом тривалого часу може

спричинити явища сенсibiliзації. У такому разі слід припинити лікування та проконсультуватись з лікарем щодо подальшої терапії.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Синтетичний протигрибковий засіб широкого спектра дії. Препарат активний відносно дерматофітів (*Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton*), *Pityrosporum orbicularis* і *P. ovalis*, дріжджових грибів родини *Candida* і пліснявих грибів, збудників системних мікозів. Препарат чинить антибактеріальну дію відносно грамозитивних мікроорганізмів.

Фармакокінетика. Незначна системна абсорбція фентиконазолу нітрату після нанесення на шкіру підтверджена дослідженнями рівня препарату в плазмі крові протягом і в кінці курсу лікування. Біодоступність знаходиться в прямій залежності від величини дози.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: гомогенний крем білого або майже білого кольору.

Термін придатності. Термін придатності - 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 30 г крему в алюмінієвих тубах у картонній упаковці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. Рекордате хімічна і фармацевтична компанія С.п.А.

Місцезнаходження. Via M Civitali 1, Мілан (Італія).