

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ОФТАДЕК
(OFTADECUM)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: Decametoxin; 1,10-Декаметилен-біс(N,N-

диметилментоксикарбонілметил)-амонію дихлорид;

основні фізико-хімічні властивості: безбарвна прозора рідина;

склад: 5 мл розчину містять декаметоксину 0,001 г;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода очищена.

Форма випуску. Краплі очні.

Фармакотерапевтична група. Протимікробні засоби, які застосовуються в офтальмології.

Код АТС S01A X20**.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат виявляє антисептичну дію і має широкий спектр антимікробної дії відносно грампозитивних (стафілококи, пневмококи, стрептококи) і грамнегативних (гонококи, мейнгококи) коків, коринебактерій, грамнегативних бактерій, (ентеробактерії, псевдомонади), найпростіших, дерматофітів, дрожжеподібних грибів роду *Candida*, хламідії і вірусів. У процесі застосування Офтадеку резистентні варіанти мікроорганізмів формуються повільно. Препарат потенційно є дію традиційних антимікробних засобів при комплексному лікуванні.

Фармакокінетика. Не досліджена.

Показання для застосування. Офтадек застосовують при гострому і хронічному кон'юнктивітах, блефарокон'юнктивітах, гонобленорей, хламідіозному ураженні слизової ока, для профілактики бленорей у новонароджених, призначають у передопераційний період і після офтальмологічних операцій для профілактики гнійно-запальних ускладнень. Офтадек застосовують також для обробки контактних лінз.

Спосіб застосування та дози. Для лікування гострого і хронічного кон'юнктивітів, блефарокон'юнктивітів, гонобленорей, хламідіозного ураження кон'юнктиви Офтадек закапують у кон'юнктивальний мішок по 2-3 краплі 4-6 разів на добу до повного одужання.

Для профілактики бленорей у новонароджених в очі закапують по 2 краплі препарату безпосередньо після народження і через 2 години після пологів. Для профілактичної метою Офтадек призначають по 2-3 краплі 4-6 разів на день за добу до операційного втручання і протягом 3-5 днів після операції. Контактні лінзи занурюють у розчин препарату на 10-15 хвилин, після чого обполіскують у стерильному ізотонічному розчині натрію хлориду.

Побічна дія. Можлива реакція місцевого подразнення ока при підвищеній індивідуальній чутливості до декаметоксина.

Протипоказання. Індивідуальна несприйнятливості декаметоксину.

У випадку індивідуальної несприйнятливості слід утриматися від застосування препарату.

Передозування. Симптоми передозування не виявлені.

Особливості застосування. Даних немає.

Вагітність та період лактації.

У періоди вагітності і лактації застосування препарату можливо, оцінюючи співвідношення користі і шкоди.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не досліджена.

Умови та термін зберігання. Зберігати в захищеному від світла місці, недоступному для дітей. Термін зберігання – 3 роки; після відкриття флакону – 14 діб.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. Флакони по 5 мл з кришкою-крапельницею.

Виробник. Філія ТОВ „Дослідний завод „ГНЦЛС”.

Адреса. м. Харків, вул. Воробйова, 8.