

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
БРОНХІАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ БЕЛЛ'С
(BELL'S BRONCHIAL BALSAM)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: сироп темно-коричневого кольору із запахом ментолу.

склад: 5 мл розчину містить 1 мг ментолу (левоментолу), 0,0035 мл анісової олії, 0,025 мл настоянки перцю;

допоміжні речовини: олія імбиру, гвоздична олія, м'ятна олія, хлороформ, гліцерин, глюкоза рідка, сахароза, трагакант, бензойна кислота, карамель, настоянка бензоїну, бальзам Толу, спирт етиловий 90%, вода очищена.

Форма випуску. Розчин для перорального застосування.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТС R05X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Комбінований препарат рослинного походження, який застосовується при застудних захворюваннях дихальних шляхів. Препарат виявляє муколітичну, бронхолітичну, відхаркувальну, протизапальну, заспокійливу та потогінну дію.

Ментол чинить спазмолітичну, антисептичну, місцевоанестезуючу дію, позбавляє дихальні шляхи від слизу. Анісова олія має відхаркувальні властивості, спазмолітичну та антибактеріальну дію. Настоянка перцю чинить відволікаючий ефект.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Симптоматичне лікування інфекційно-запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем, болем в горлі, нежиттю (фарингіт, ларингіт, трахеїт, бронхіт, пневмонія); „бронхіт курця”; „лекторський” ларингіт, механічне подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів.

Спосіб застосування та дози. Застосовують внутрішньо.

Дорослим та дітям старше 12 років - по дві чайних ложки (10 мл) щогодини або по три чайних ложки (15 мл) кожні 2-3 години.

Дітям 6-12 років – по одній чайній ложці (5 мл) щогодини або по дві чайних ложки (10 мл) кожні 2-3 години.

Дітям 3-6 років - по одній чайній ложці (5 мл) кожні 2 години.

Перед застосуванням пляшечку струсити.

Не застосовувати більше 6 доз протягом доби. Курс лікування складає 14 днів.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції на компоненти препарату.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати дітям до 3 років.

Передозування. Випадки передозування не описані.

Особливості застосування. З обережністю застосовувати хворим на цукровий діабет, тому що препарат у своєму складі містить сахарозу, глюкозу. Препарат не чинить снодійного ефекту, не впливає на здатність керування транспортом і роботу зі складними механізмами. Препарат може застосовуватися для лікування жінок під час вагітності та годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Взаємодія не описана.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 С. Термін придатності – 3 роки. Після кожного застосування препарату пляшку слід закрити кришкою і зберігати у вищевказаних умовах до закінчення терміну придатності.

Правила відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Склояна пляшка 200 мл в картонній коробці.

Виробник. БЕЛЛ, САНЗ & КО. (ДРАГГІСТС) ЛІМІТЕД

Адреса. Гілфорд Хауз, Слейдберн Кресцент, Саутпорт, PR9 9AL, Англія