ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ПАПАЗОЛ-ДАРНИЦА

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: 1 таблетка содержит бендазола гидрохлорида 30 мг в пересчете на 100% сухое вещество, папаверина гидрохлорида 30 мг в пересчете на 100% сухое вещество;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, кальция стеарат.

Лекарственная форма. Таблетки.

Таблетки плоскоциллиндрической формы с фаской, белого цвета.

Название и местонахождение производителя. ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница». Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.

Фармакотерапевтическая группа. Периферические вазодилататоры.
Код АТС С04А Х51**.

Фармакологические свойства.
Комбинированный препарат, в состав которого входят алкалоид папаверин и производное имидазола − бендазол. Папаверин − блокатор внутриклеточной фосфодиэстеразы и креатинфосфокиназы в гладких мышцах сосудов, вызывает накопление циклической АМФ, уменьшает содержание внутриклеточного кальция, вызывает вазодилататорный эффект. Эффект в основном проявляется на резистентных артериях, вследствие чего уменьшается общее сосудистое сопротивление и снижается артериальное давление.
Папаверин снимает спазм гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих и мочевыводящих путей. Бендазол − средство, непосредственно влияющее на состояние гладких мышц сосудистой стенки за счет влияния на имидазоловые рецепторы. Снижает артериальное давление, содержание свободного кальция в гладких мышцах. Снимает спазм гладких мышц органов брюшной полости. Стимулирует функции спинного мозга. При длительном применении осуществляет иммуномодулирующее действие, повышает синтез интерферона, способствует синтезу антител, повышает активность фагоцитов, способствует профилактике острых респираторных вирусных инфекций. Повышает способность ткани противостоять гипоксии, повышает синтез нуклеиновых кислот и белка.

Показания к применению.
Умеренно выраженный спазм периферических сосудов, транзиторный спазм сосудов мозга. Пилороспазм, спастический колит, холецистит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечная колика. Спазм мочевыводящих путей. Моно- и полиневриты. Остаточные явления перенесенного полиомиелита. Паралич лицевого нерва. В качестве дополнительного средства в составе комплексной терапии артериальной гипертензии.

Противопоказания.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Нарушения AV–проводимости. Артериальная гипотензия. Судорожный синдром. Бронхообструктивный синдром. Гипотонический колит, привычный запор. Черепно-мозговая травма. Тяжелая печеночная и почечная недостаточность. Гипотиреоз. Надпочечная недостаточность. Гипертрофия предстательной железы. Дети в возрасте до 12 лет (для данной формы препарата).

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Необходимые меры предосторожности при применении.
Препарат с осторожностью применяют при снижении перистальтики кишечника.

Способность влиять на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими механизмами. При применении препарата желательно воздержаться от вождения автотранспорта и управления сложными механизмами.

Дети. В данной лекарственной форме препарат применяют для детей старше 12 лет.

Способ применения и дозы.
Взрослым препарат назначают внутрь за 2 часа до еды или через 2 часа после еды по 1 таблетке 2 - 3 раза в день. Препарат может применяться короткими или длительными курсами в зависимости от заболевания. При кишечной колике и пилороспазме курс лечения короткий – 1 - 2 дня, в составе комплексной терапии остаточных явлений перенесенного полиомиелита или при параличе лицевого нерва – длительный от нескольких недель до нескольких месяцев.

Передозировка. Симптомы отравления представляют собой сочетание передозировки папаверином и бендазолом. Симптомы отравления папаверином: диплопия, слабость, сонливость, заторможенность. Симптомы отравления бендазолом: артериальная гипотония, снижение перфузии тканей, аритмия, головная боль, слабость.
Лечение: отмена препарата, промывание желудка до чистых промывных вод, солевое слабительное и взвесь активированного угля вовнутрь.

Побочные эффекты.
Аллергические реакции: кожные высыпания, кожный зуд.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, запоры, дискомфорт.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: AV–блокада, аритмии, снижение сократимости миокарда, артериальная гипотензия.
Прочие: повышенное потоотделение, головокружение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
При одновременном применении препарата со спазмолитиками, седативными лекарственными средствами, диуретиками, трициклическими антидепрессантами, прокаинамидом, резерпином, хинидином возможно усиление гипотензивного эффекта.
Ослабляет действие блокаторов холинэстеразы галантамина, прозерина, физиостигмина на гладкую мускулатуру.

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие лекарственные средства уменьшают всасывание препарата в желудочно–кишечном тракте.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. Препарат необходимо хранить в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.

Упаковка. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com