

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
МАРИМЕР
(MARIMER)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин з солонуватим смаком;

склад: 100 мл розчину містять стерильний розчин морської води 31,82 мл;

допоміжні речовини: вода очищена.

Форма випуску. Краплі назальні.

Фармакотерапевтична група. Засіб, що застосовується при захворюваннях порожнини носа.

Код АТС R01A X10.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Сприяє підтриманню нормального фізіологічного стану слизової оболонки носа.

Сприяє розрідженню слизу і полегшує його видалення з носової порожнини.

Мікроелементи, що входять до складу препарату, покращують функцію миготливого епітелію, що посилює резистентність слизової оболонки носа до патогенних бактерій і вірусів.

При алергічних ринітах сприяє видаленню алергенів зі слизової носа, зменшенню місцевого запального процесу.

Мікродифузна система розпилення препарату забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, що сприяє ефективному впливу мікроелементів.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування.

- Гострі і хронічні запальні захворювання порожнини носа, додаткових пазух і носоглотки;
- профілактика інфекційних захворювань носа і носоглотки;
- алергічні і вазомоторні риніти;
- профілактика запальних процесів після оперативних втручань;
- щоденна гігієна порожнини носа для збереження захисних властивостей слизової оболонки в умовах підвищеної сухості або забруднення повітря (кондиціонування, центральне опалення тощо).

Спосіб застосування та дози.

Інтраназально.

Дітям віком до 1-го року – по 2 краплі у кожний носовий хід із лікувальною метою 4 рази на добу, з гігієнічною метою – 1-4 рази на день.

Дітям віком від 1-го року та дорослим – по 2 краплі у кожний носовий хід з лікувальною метою 4-6 разів на добу, з гігієнічною метою – 1-4 рази на день.

Курс лікування становить до 4 тижнів. Рекомендується повторити курс лікування через місяць.

Дітям віком до 2-х років – промивання виконується у положенні лежачи, повернувши голову дитини набік, промити верхній носовий хід, повторити процедуру з іншим носовим ходом.

Дітям віком від 2-х років та дорослим – нахилити голову вбік, промити верхній носовий хід, повторити процедуру з іншим носовим ходом.

Побічна дія.

Можливі реакції підвищеної чутливості до компонента препарату.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Передозування.

Не відмічене.

Особливості застосування.

Одноразовий флакон відкривається поворотом насадки. Насадка повністю відокремлюється і може бути використана для закриття флакона.

Відкритий флакон необхідно використати протягом однієї доби.

Застосування в період вагітності та годування груддю.

Дозволено застосування в період вагітності та годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.

Препарат системно не впливає на організм, взаємодія з іншими лікарськими засобами не відмічена. Може застосовуватися з іншими лікарськими засобами у складі комбінованої терапії.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 С у недоступному для дітей місці.

Термін придатності – 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 5 мл у одноразових флаконах-крапельницях; по 12 флаконів у картонній коробці.

Виробник. Лабораторії ЖІЛЬБЕР, Франція.

Представлено в Україні „Нікомед Австрія ГмБХ”, Австрія.

Адреса. 928 Avenue du General de Caulle, 14200 Herouville Saint, France.