

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ
(за Вишневським)
(BALMY LINIMENT (by Vishnevsky))

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г лініменту містить ксероформу 0,03 г, дьогтю березового 0,03 г;
допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, олія рицинова.

Лікарська форма. Лінімент.

Лінімент від слабко-жовтавого до бурого або до бурого з зеленкуватим чи синюватим відтінком кольору зі специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”.
Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 17.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Код АТС D08A X10.

Фармакологічні властивості. Бальзамічний лінімент за Вишневським має дезінфікуючі властивості завдяки компонентам, що входять до його складу. Препарат виявляє протизапальну, слабку подразнювальну дію на рецептори тканин, сприяє прискоренню процесу загоєння ран, нормалізуючи кровопостачання тканин.

Показання для застосування.

Абсцеси;
фурункули;
пролежні;
лімфаденіти;
лімфангіти;
опіки;
відмороження.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до фенолу та його похідних;
підвищена чутливість до інших компонентів, що входять до складу лініменту.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Перед початком лікування порадьтеся з лікарем!

Дьоготь березовий, який входить до складу бальзамічного лініменту, здатний підвищувати чутливість до сонячного світла, тому влітку слід уникати перебування на сонці під час лікування препаратом.

Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або, навпаки, стан здоров'я погіршиться, або почнуться небажані явища, необхідно призупинити застосування препарату та звернутися за консультацією до лікаря щодо подальшого застосування.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Дотепер не зареєстровано інформації про будь-який несприятливий вплив бальзамічного лініменту при лікуванні в період вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Дотепер не зареєстровано інформації про будь-який несприятливий вплив на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Діти.

Особливих застережень немає.

Спосіб застосування та дози.

Лінімент застосовують зовнішньо: наносять 2 – 3 рази на добу тонким шаром на уражені ділянки шкіри або накладають пов'язку в 5 – 6 шарів марлі, просякнutoї препаратом. Пов'язку фіксують.

Перев'язку проводять до повного очищення інфікованої ділянки шкіри.

Передозування. Дотепер невідоме.

Побічні ефекти. При тривалому застосуванні можлива поява місцевої алергічної реакції (шкірні висипи, свербіж), що потребує проведення протиалергічної терапії.

У разі виникнення будь-яких негативних реакцій обов'язково порадьтеся з лікарем стосовно подальшого застосування препарату!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія невідома.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в захищеному від світла, недоступному для дітей місці при температурі від 8 °С до 15 °С.

Упаковка. По 40 г у тубі, по 1 тубі пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.