

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЙОДОВІТАЛ КІДЗ
(IODOVITAL KIDS)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: potassium iodide;

основні фізико-хімічні властивості: круглі двояковипуклі таблетки від світло-рожевого до малинового кольору зі світлими та темними вкрапленнями;

склад: 1 таблетка містить 100 мкг йоду (у вигляді калію йодиду);

допоміжні речовини: магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний, лимонна кислота, олія бавовняна, полуничний аромат, ванільний аромат, кармін, сорбіт.

Форма випуску. Таблетки жувальні.

Фармакотерапевтична група. Препарати йоду, що застосовуються при захворюваннях щитовидної залози. Код АТС Н03С А.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Препарат неорганічного йоду. Усуває дефіцит йоду та відновлює порушений синтез тиреоїдних гормонів в організмі дитини.

Фармакокінетика. Після прийому всередину добре всмоктується в травному тракті. Виводиться переважно нирками, частково через потові залози та з калом.

Показання для застосування. Профілактика йододефіцитних станів, в тому числі профілактика зобу при недостатньому надходженні йоду в організм у дітей 2 років та старше; лікування зобу, обумовленого дефіцитом йоду.

Спосіб застосування та дози. По 1 таблетці на добу після їди. Таблетки слід розжовувати. Тривалість застосування препарату визначають індивідуально.

Побічна дія. Алергічні реакції (шкірний висип, еозинофілія, дуже рідко – анафілактичний шок), прояви гіпертиреозу — тахікардія, тремор, підвищена збудженість, безсоння, підвищене потовиділення, діарея.

Протипоказання. Синдром Дюринга-Брока, аденоматозний зоб, автономна аденома, нефрит, підвищена чутливість до йоду.

Передозування. Симптомами гострого передозування являються: забарвлення слизової оболонки порожнини рота в коричневий колір, риніт, бронхіт, гастроентерит, набряк голосових зв'язок, кровотеча з сечовивідних шляхів, анурія, колапс (аж до летального результату).

Лікування: промивання шлунку розчином крохмалю (до зникнення синього забарвлення розчину) і 1% розчином натрію тіосульфату, прийом кашки з муки, кукурудзяного, картопляного, рисового чи вівсяного густого відвару, симптоматична і підтримуюча терапія.

Особливості застосування. Не перевищувати рекомендовану дозу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Антитиреоїдний ефект підсилюють (взаємно) антитиреоїдні препарати. Тиреотропний гормон активує акумуляцію йоду щитовидною залозою, перхлорат і тіоціонат калію – гальмують. Прийом високих доз йодиду одночасно з калійзберігаючими діуретиками підвищує ризик розвитку гіперкаліємії і аритмії. При одночасному прийомі з інгібіторами АПФ також підвищується ризик розвитку гіперкаліємії, з літєм – ризик розвитку гіпотиреозу та виникнення зобу.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі до 30 °С, в недоступному для дітей місці, в щільно закритій оригінальній упаковці. Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 30, 60 або 100 таблеток у пластиковому флаконі, по 1 флакону в картонній коробці. По 15 таблеток в блістері; по 1, 2, 3, 4 або 5 блістерів в картонній коробці.

Виробник. Юніфарм, Інк.

Адреса. 350 П'ята Авеню, 6701, Нью-Йорк, 10118, США.