

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ТУЯ КОМП МІДНИЙ ВЕРШНИК
(THUJA COMP COOPER RIDER)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від безбарвного до світло жовтого кольору із слабким спиртовим запахом;
склад: 100 г препарату містять туї західної D6 – 0,3 мг, золота металічного D12 – 1×10^{-7} , меркуріусу солюбілісу за Ганеманом D12 – 1×10^{-7} (за гомеопатичною фармакопесю Німеччини);
допоміжні речовини: спирт етиловий.

Форма випуску. Краплі гомеопатичні.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в урології. Код АТС G04BX50.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. До складу препарату входять три відомі гомеопатичні монопрепарати. У гомеопатії Thuja occidentalis традиційно застосовується при простатиті, збільшенні передміхурової залози у хворих літнього віку та після неспецифічних або специфічних захворювань сечостатевої системи у чоловіків. Aurum metallicum застосовують при гіперемії та запальному ущільненні різних органів. Mercurius solubilis Hahnemann виявляє вибірково дію на слизові оболонки і тканини залоз та застосовується при запальних та гнійних процесах у цих тканинах.

Препарат має простатотропні властивості, обумовлені помірною андрогенною активністю, протизапальними та анальгезивними властивостями, а також здатністю покращувати мікроциркуляцію тканин передміхурової залози.

Як додатковий ефект виявлено наявність гастро- та гепатопротекторної, діуретичної та седативної дії.

Фармакокінетика. Препарат швидко та майже повністю всмоктується після перорального застосування. Дія препарату є сукупною дією його компонентів. Проведення кінетичних спостережень не можливе, оскільки усі разом компоненти не можуть бути відстежені за допомогою маркерів або біодосліджень. З цієї ж причини неможливо виявити і метаболіти препарату.

Не утворює токсичних метаболітів. Не депонується у тканинах організму.

Показання для застосування. Хронічний простатит, доброякісна гіперплазія передміхурової залози у поєднанні з простатитом.

Спосіб застосування та дози. Дозу встановлюють індивідуально. Препарат застосовується за 30 хвилин до або через одну годину після їжі по 10 крапель, розведених в 1/2 склянки води, 3 рази на добу. Тривалість курсу лікування становить 8 тижнів. Після зникнення симптомів захворювання важливо закріпити терапевтичний ефект 3-4-місячним прийомом препарату, незважаючи на відсутність симптоматики.

Побічна дія. На початку лікування можливе тимчасове посилення симптомів захворювання.

У разі погіршення стану слід обов'язково зробити перерву у застосуванні препарату на 7-10 діб.

Противпоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Передозування. Симптоми: нудота, блювання.

Лікування: у разі передозування необхідно негайно промити шлунок. У подальшому проводять симптоматичну терапію. При тяжкому отруєнні хворого слід госпіталізувати. Специфічного антидоту не існує.

Особливості застосування. Ефективність та безпечність застосування препарату для дітей не досліджені.

Із застосуванням препарату добре поєднуються нехімічні види лікування передміхурової залози (фізіотерапія, акупунктура, рослинні препарати).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Значущих явищ несумісності з лікарськими препаратами інших груп не виявлено.

Будь-які способи лікування інших захворювань припустимі у повному обсязі.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Флакони-крапельниці по 25 мл у картонній упаковці.

Виробник. ТОВ „Таліон-А”.

Адреса. Росія, м. Москва, Відкрите шосе, 12.

Тел/факс (495) 963-47-82