

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ФЛУРЕНІЗИД
(FLURENIZIDUM)

Загальна характеристика:

хімічна назва: (N-(9-флуореніліден)-N-ізонікотиногідразид);

основні фізико-хімічні властивості: супозиторії жовтого або зеленувато-жовтого кольору;

склад: 1 супозиторій містить флуренізиду – 0,1 г;

допоміжних речовин: жир твердий.

Форма випуску. Супозиторії вагінальні.

Фармакотерапевтична група. Протимікробні засоби. Код АТС G01A X10.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Антихламідійний засіб. Має протимікробну дію відносно *Chlamidia trachomatis*. Точний механізм його дії не встановлений. Препарат високоефективний проти мікобактерій туберкульозу, має імуномодулюючі властивості, покращує функцію тимуса, селезінки та печінки, легко проникає у тканини та рідини організму.

Фармакокінетика. У крові препарат виявляється через 1 годину після введення вагінальних супозиторіїв з флуренізидом. Після введення препарату в піхву період напіввиведення становить 8 год. Флуренізид метаболізується у печінці. Виводиться в основному з калом та у незначній кількості з сечею у незмінному стані та у вигляді метаболітів.

Показання для застосування. Урогенітальний хламідіоз (хламідійний ендocerвіцит, уретрит, аднексит, ендометрит).

Спосіб застосування та дози. Дорослим призначають по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом 21 дня.

Побічна дія. Побічної дії не виявлено.

Протипоказання. Підвищена чутливість до флуренізиду.

Передозування. Даних щодо передозування препарату немає.

Особливості застосування. При застосуванні препарату можливе зниження рівня глюкози, що вимагає корекції дозування гіпоглікемічних препаратів у хворих на цукровий діабет II типу. Під час лікування рекомендується утриматися від статевого життя, одночасне лікування обох партнерів є обов'язковим. Даних щодо застосування препарату у дітей немає. В період вагітності та лактації флуренізид призначають у випадках, коли, на думку лікаря, користь для плоду від застосування переважає потенційний ризик.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Флуренізид можна поєднувати з усіма препаратами симптоматичної дії та протимікробними засобами для системного застосування.

Умови та термін зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі від +8 °С до +15 °С. Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. По 5 супозиторіїв у стрипах. По 2 стрипи в пачці.

Виробник. ВАТ "Монфарм".

Адреса. Україна, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8.