

**И Н С Т Р У К Ц И Я**  
**по медицинскому применению препарата**  
**БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ ЦВЕТКИ**  
**(SAMBUCI NIGRAE FLORES)**

**Общая характеристика:**

*международное название:* Sambucus nigra L.;

*основные физико-химические свойства: цельное сырье:* отдельные цветки и бутоны на коротких голых цветоножках или без них с примесью веточек, соцветий и листьев. Цвет желтоватый. Запах ароматный. Вкус пряный;

*порошок крупный:* смесь измельченных кусочков цветков и бутонов с примесью цветоножек, веточек и листьев различной формы, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. Цвет желтоватый с буроватыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус пряный;

*состав:* бузины черной цветки.

**Форма выпуска.** Цветки.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средства применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТС R05X.

**Фармакологические свойства.** Цветки бузины содержат гликозиды самбунигрин и рутин, масло эфирное, кислоты органические (кофейная, яблочная, валериановая, хлорогеновая), вещества дубильные, кислоту аскорбиновую. Этот комплекс биологически активных веществ оказывает потогонное, противовоспалительное, болеутоляющее, мочегонное и мягкое отхаркивающее действие.

**Показания к применению.** Грипп, воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты, ларингиты), почек и мочевого пузыря.

**Способ применения и дозы.** 5 г (1,5 столовые ложки) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, остаток отжимают к процеженному настою. Объем настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают в теплом виде по 1/2 стакана 2 раза в день или по 2 столовые ложки 5-6 раз в день после еды. Дети, старше 3 лет, в зависимости от возраста - от 1 столовой ложки до 1/3 стакана 2 раза в день после еды. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, закрывают и настаивают 15 мин. Взрослые принимают в теплом виде по 1/2 стакана 3 раза в день после еды. Дети, старше 3 лет, в зависимости от возраста - от 2 десертных ложек до 1/3 стакана 3 раза в день после еды.

Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально с учетом характера, степени тяжести и особенностей течения заболевания, устойчивости достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

**Побочное действие.** При индивидуальной повышенной чувствительности к препарату возможно развитие аллергических реакций (гиперемия, сыпь, зуд и отечность кожи). При появлении побочных реакций прекратить прием препарата.

**Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к биологически активным веществам, содержащимся в лекарственном средстве.

**Передозировка.** Сообщений о передозировке препарата не поступало.

**Особенности применения.** Беременным и женщинам, кормящим грудью, применение препарата только в случае, если, по мнению врача, польза от применения превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Неизвестно.

**Условия и сроки хранения.** Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте. Приготовленный настой - в прохладном (8-15 °С) месте, не более 2 суток.

Срок годности - 2 года.

**Порядок отпуска.** Без рецепта.

**Упаковка.** Цельное сырье по 50 г в пачках с внутренним пакетом, порошок крупный по 1,5 г в фильтр-пакетах № 20.

**Производитель.** ЗАО "Лектравы".

**Адрес.** Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.