

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПСОРИКАП
(PSORICAP)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: Pyrithione zinc;

біс-(1-гідрокси-2[1H]-піридин-тіонат-О,S)-цинк;

основні фізико-хімічні властивості: крем білого кольору;

склад: 100 г крему містять цинку піритіонату - 0,2 г;

допоміжні речовини: ніпагін, бутилгідрокситолуол, гліцерилмоностеарат, полігліцерил-3-метилглюкози дистеарат, сахарози кокоат, метилглюкет-10, стеариловий спирт, октилдодеканол, ізопропілпальмітат, циклометикон, гліцерин, кислоти лимонної моногідрат, вода очищена.

Форма випуску. Крем для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні засоби. Піритіон цинку.

Код АТС D11A X12.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. При зовнішньому застосуванні препарат виявляє антибактеріальну та протигрибкову дію. Активний щодо таких патогенних бактерій, як *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.* та ін. Протигрибкова активність препарату особливо виражена відносно *Pytyrosporum ovale* та *Pytyrosporum orbiculare*, які спричиняють запалення і надмірне лущення при псоріазі та інших захворюваннях шкіри. Крім того, препарат активний відносно дерматофітів (*Trichophyton spp.*, *Microsporum spp.*), дріжджових грибів (*Candida spp.*, *Cryptococcus*), пліснявих грибів (*Aspergillus spp.*, *Penicillium*) тощо. Препарат діє на мікроорганізми, які містяться як на поверхні, так і в глибоких шарах дерми.

Препарат виявляє антипроліферативну дію на клітини епідермісу; цинку піритіонат пригнічує патологічний ріст клітин поверхневих шарів шкіри, що перебувають у стані патологічної гіперпроліферації, і усуває надмірне лущення при псоріазі та інших захворюваннях шкіри. У терапевтичних концентраціях препарат не пригнічує клітини, які нормально функціонують.

Цинку піритіонат у складі крему стабілізує мембрани клітин, нормалізує активність мембранозв'язаних ферментів. В основі молекулярного механізму дії препарату лежить здатність цинку піритіонату індукувати транслокацію і активацію протеїнкінази С. Це забезпечує відповіді на рівні клітин, що опосередковані протеїнкіназою С.

Кремова основа забезпечує гідратуючу (зволожуючу) та пом'якшуючу дію щодо шкіри, допомагає усунути печіння та свербіж. Крім того, допоміжні речовини, що входять до складу препарату, збільшують ефективність антимікробної дії цинку піритіонату.

Фармакокінетика. При зовнішньому застосуванні крему цинк піритіонат депонується в епідермісі та поверхневих шарах дерми. Системна абсорбція відбувається повільно.

Виявляється в крові у слідових кількостях.

Показання для застосування. Псоріаз, атопічний дерматит, нейродерміт, себорейна екзема, запалення та підвищена сухість шкіри.

Спосіб застосування та дози. Крем застосовують місцево. Дозу препарату встановлюють індивідуально, оскільки вона залежить від площі ураженої ділянки. Крем необхідно наносити на уражену ділянку тонким шаром 2 рази на добу, обережно втираючи у шкіру. Для підвищення ефективності лікування та розсмоктування щільних псоріатичних бляшок та інфільтратів можна застосовувати оклюзійні пов'язки. Тривалість лікування визначається ліквідацією запального процесу, припиненням свербіжу, очищенням шкіри; курс лікування залежить від виду та тяжкості

Сторінка 2 з 2. Видавець: Державний експертний центр МОЗ України
захворювання, визначається лікарем і звичайно становить при псоріазі 4 – 6 тижнів, а при атопічному дерматиті та нейродерміті – 3 – 4 тижні; при інших захворюваннях крем застосовують до повного зникнення їх симптомів. При залишкових явищах (гіперемія, сухість, лущення, пігментація) крем продовжують застосовувати ще протягом 1 – 2 тижнів.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Діти до 3 років.

Передозування. У випадку збільшення частоти застосування крему може виникнути легке короткочасне локальне печіння шкіри.

Лікування: крем слід змити водою. Рекомендується поступова відміна препарату.

Особливості застосування. В період ремісії крем наносять на ділянки шкіри при появі перших ознак загострення захворювання. Не допускати потрапляння крему в очі.

Препарат можна використовувати у період ремісії для підтримуючої терапії та профілактики рецидивів, що дає змогу швидко усунути маніфестну фазу та прискорити клінічне одужання.

Вагітність та годування груддю не є протипоказаннями для застосування препарату. Але слід уникати застосування крему на великих поверхнях шкіри. Крем не слід наносити на соски в період годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Препарат не рекомендується застосовувати разом з мазями або кремами, які містять глюкокортикостероїди.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі від 15°C до 25°C. Не заморожувати.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 30 г у тубі, 1 туба в пачці.

Виробник. ВАТ «Київмедпрепарат».

Адреса. Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

Тел. (044) 490 7522.