

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ФРИДЕРМ ЦИНК
FREEDERM ZINC

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: біло-кремового кольору рідина, без сторонніх домішок;

склад: 100 мл шампуню містять цинку піритіону 2 г;

допоміжні речовини: ТЕА-лаурилсульфат, ПЕГ-8-дистеарат, МЕА-кокамід, ДЕА-кокамід, натрію хлорид, вігум, гідроксипропілметилцелюлоза, вода очищена.

Форма випуску. Шампунь медичний дерматологічний.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні засоби. Піритіон цинк. Код АТС D11А Х12.

Фармакологічні властивості. Медичний лікувально-профілактичний препарат для місцевого застосування з протисвербіжною, антибактеріальною та протигрибковою дією.

Фармакодинаміка. Суспензія піритіону цинку при зовнішньому застосуванні чинить протимікробну та протигрибкову дію. Препарат ефективний щодо стрептококів, стафілококів, грибків (зокрема *Pityrosporum orbiculare*) та низки інших патогенних мікроорганізмів. Цинку піритіон обумовлює протисеборейну дію препарату та дію проти лупи.

Фармакокінетика. Дані з фармакокінетики препарату не представлені.

Показання для застосування. Себорейний дерматит волосистої частини голови, що супроводжується появою лупи та свербіжжю, висівковий лишай, атопічний дерматит та дифузне порідіння волосся (в т.ч. у складі комплексної терапії).

Спосіб застосування та дози. Перед застосуванням ретельно збовтати флакон. Намочити волосся. Невелику кількість препарату Фридерм Цинк нанести на вологе волосся, втерти до утворення піни та ретельно промити. Після цього нанести шампунь повторно, залишити піну на 5 хв, потім ретельно промити волосся. Препарат рекомендовано застосовувати 2 рази на тиждень протягом перших 2 тижнів лікування, потім 1 – 2 рази на тиждень протягом 1,5 – 2 місяців. При необхідності курс лікування можна повторити.

Побічна дія. Не описана.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Особливості застосування. Фридерм Цинк є гіпоалергенним препаратом та не чинить подразнення.

Після досягнення бажаного ефекту рекомендовано застосовувати препарат Фридерм рН-Баланс для профілактики захворювань шкіри волосистої частини голови. При себорей та себорейному дерматиті волосистої частини голови, які супроводжуються підвищеним виділенням шкірного сала, а також при псоріазі волосистої частини голови, рекомендується спочатку застосовувати протисеборейний препарат Фридерм Дьоготь.

Тільки для зовнішнього застосування. Уникати потрапляння в очі. При потраплянні в очі промити чистою водою.

Застосування в педіатричній практиці. Даних щодо застосування препарату у дітей немає.

Вагітність і лактація. Досліджень щодо безпеки застосування препарату у вагітних та жінок, які годують груддю, не проводилось.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не виявлена. Сумісний з іншими засобами для лікування та догляду за волоссям.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від 2°C до 30°C. Термін придатності – 4 роки. Застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці, не рекомендується.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Флакони по 150 мл у картонній коробці.

Виробник. Завод: Шерінг-Плау Фарма Лда., Португалія, власна філія Шерінг-Плау Корпорейшн, США. Дистриб'ютор: Шерінг-Плау Сентрал Іст АГ, Люцерн, Швейцарія.

Адреса. Schering-Plough Farma Lda., Rua Agualva dos Açores, n° 16 2735-557 Agualva – Cacém, Portugal (subsidiary of Schering-Plough Corporation, USA).