

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ГЕПАР КОМП. ХЕЕЛЬ
(HEPAR COMP. HEEL)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, від безбарвного до злегка рожевого кольору розчин без запаху;

склад: 2,2 мл містять: Hepar suis D8 – 22 мг, Cyanocobalaminum D4 – 22 мг, Duodenum suis D10 – 22 мг, Thymus suis D10 – 22 мг, Colon suis D10 – 22 мг, Vesica fellea suis D10 – 22 мг, Pankreas suis D10 – 22 мг, Cinchona pubescens D4 – 22 мг, Lycopodium clavatum D4 – 22 мг, Chelidonium majus D5 – 22 мг, Silybum marianum D3 – 22 мг, Histaminum D10 – 22 мг, Sulfur D13 – 22 мг, Avena sativa D6 – 22 мг, Natrium diethyloxalaceticum D10 – 22 мг, Acidum alpha-ketoglutaricum D10 – 22 мг, Acidum DL-malicum D10 – 22 мг, Acidum fumaricum D10 – 22 мг, Calcium carbonicum Hahnemannii D28 – 22 мг, Taraxacum officinale D4 – 22 мг, Cynara scolymus D6 – 22 мг, Veratrum album D4 – 22 мг, Acidum alpha-liponicum D8 – 22 мг, Acidum oroticum D6 – 22 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Форма випуску. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Препарат відновлює дезінтоксикаційну функцію печінки, має гепатопротекторну, жовчогінну, регенеруючу, метаболічну, антиоксидантну дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

Фармакокінетика. Для гомеопатичних препаратів не визначається.

Показання для застосування. Дискінезія жовчовивідних шляхів, гострі та хронічні захворювання печінки та жовчовивідних шляхів. Порушення діяльності печінки при різних соматичних захворюваннях, а також внаслідок довготривалої дії різних токсичних факторів.

Спосіб застосування та дози. Разова доза: дорослим і дітям від 6 років – 1 ампула по 2,2 мл, новонародженим і дітям до 1 року – 0,4 мл, від 1 до 3 років – 0,6 мл, від 3 до 6 років – 1,0 мл. Застосовувати 1 – 3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних, а за необхідності – внутрішньовенних (струминно) ін'єкцій, а також в акупунктурні точки або перорально. Перорально препарат вживати, розчинивши разову дозу в 5 – 10 мл води, розчин слід випити, затримуючи на декілька секунд у роті.

При лікуванні дітей вміст ампули набирають в інсуліновий шприц, разову вікову дозу застосовують у вигляді внутрішньом'язових та підшкірних ін'єкцій або капають у рот, розчинивши в 5 мл води, залишки зберігають у шприці в темному місці при кімнатній температурі та приймають разову вікову дозу перорально в зазначений термін.

Курс лікування – 3 – 6 тижнів.

Побічна дія. В окремих випадках, можливі прояви гіперчутливості (алергічні реакції) до будь-якого з компонентів препарату.

Протипоказання. Не відомі.

Передозування. Не відзначалось.

Особливості застосування. З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого можна змінювати тривалість курсу лікування та спосіб застосування.

Питання про доцільність застосування препарату вагітними та жінками, які годують груддю, вирішується індивідуально з урахуванням ризику/користі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Сумісний з іншими лікарськими засобами.

Умови та термін зберігання. Зберігати у зовнішній картонній коробці при температурі від 15°C до 25°C.

Зберігати в місцях, недоступних для дітей!

Термін придатності – 5 років.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. 5 ампул та 100 (5x20) ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

Виробник. Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Адреса. Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.