

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ДУОФІЛМ
(Duofilm)

Склад:

Діючі речовини: кислота саліцилова, кислота молочна;

1 г розчину містить 167 мг кислоти саліцилової, 167 мг кислоти молочної;

допоміжна речовина: колодій в'язкий.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування.

Прозора в'язка рідина від жовтого до янтарного кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd./Стіфел Лабораторіз (Ірландія) Лтд.

Finisklin Industrial Estate, Sligo, Ireland/

Фінісклін Індастріал Істейт, Сліго, Ірландія.

Фармакотерапевтична група. Препарати саліцилової кислоти.

Код АТС D02 A F.

Показання для застосування.

Дуофілм показаний для лікування звичайних та підшовних бородавок.

Противпоказання.

Підвищена чутливість до складових препарату.

Дитячий вік до 2 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не представлено.

Особливі застереження.

Дуофілм не слід наносити на обличчя, статеві органи та ділянку заднього проходу. Уникати нанесення на здорову шкіру.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Обмеження щодо застосування Дуофілму в період вагітності і лактації відсутні.

Не впливає на швидкісні реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Застосування у дітей. Не показаний до застосування у дітей молодше 2 років.

Спосіб застосування та дози.

Препарат слід наносити один раз на день на уражену ділянку:

1. Намочити бородавку в гарячій воді (40-50 °C) протягом декількох хвилин.
2. Обережно протерти поверхню бородавки м'яким рушником.
3. Нанести пензликом Дуофілм виключно на бородавку, запобігаючи потраплянню розчину на здорову шкіру.
4. Дати препарату висохнути та заклеїти пластирем у разі, якщо бородавка знаходиться на стопі.
5. Лікування слід продовжувати до повного зникнення бородавки.

Дітям до 12 років слід застосовувати препарат під контролем дорослих.

Передозування.

Не описано.

Побічні ефекти.

Не виявлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.

Поки що невідома.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі нижче 25 °C у недоступному для дітей місці.

Термін придатності.

2,5 роки.

Упаковка. Картонна коробка, що містить 1 скляний флакон із пластиковою кришкою та приєднаним до неї пензликом. Скляний флакон містить 15 мл розчину для зовнішнього застосування.

Умови відпуску. Без рецепта.