

**ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування препарату**

**САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА  
(SALICYLIC ACID)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* salicylic acid;  
1 мл розчину містить саліцилової кислоти 0,01 г (10 мг);  
*допоміжна речовина:* спирт етиловий 70%.

**Лікарська форма.**

Розчин для зовнішнього застосування спиртовий.

Прозора безбарвна рідина зі спиртовим запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ЗАТ «Фармацевтична фабрика «Віола».  
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

**Фармакотерапевтична група.**

Дерматологічні засоби.

**Код ATC D01A E12.**

*Фармакологічні властивості.* Антисептичний засіб. При місцевому застосуванні чинить протимікробну, подразнювальну, відтяжну дію.

**Показання для застосування.**

Застосовують при інфекційних ураженнях шкіри: звичайних вуграх, піодермії.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Не допускати потрапляння препарату в очі, не наносити на слизові оболонки.  
*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити Вашому здоров'ю.*

**Особливі застереження.**

Не слід застосовувати препарат при вагітності та годуванні груддю, а також наносити на велике ділянки шкіри.

Досвід застосування у дітей відсутній.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовують зовнішньо, змашуючи або розтираючи уражені ділянки шкіри ватним тампоном, просоченим препаратом, 2-3 рази на добу. Курс лікування визначає лікар залежно від характеру та тяжкості захворювання.

**Передозування.**

При застосуванні великих доз препарату може посилитися кератолітична дія та алергічні реакції. У такому разі препарат необхідно змити водою, звернутися за консультацією до лікаря. Терапія симптоматична.

**Побічні ефекти.**

В окремих випадках можливі алергічні прояви, симптоми подразнення шкіри (кропив'янка, пециння, свербіж).

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Взаємодія поки що невідома.

*Якщо Ви приймаете будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це лікарю.*

**Термін придатності.**

3 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!*

**Умови зберігання.**

Зберігати у захищенному від світла місці при температурі 8 - 15 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 40 мл розчину у флаконі.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.