

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ДР.ТАЙСС
(NASAL SPRAY DR. THEISS)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: xylometazoline; 2-(4'-*трет*-бутил-2'-6'-диметилбензил) імідазоліну гідрохлорид;

основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин світло-жовтого кольору з характерним запахом;

склад: 1 мл розчину містить ксилометазоліну гідрохлориду 1 мг;

допоміжні речовини: натрію дигідрофосфату дигідрат, динатрію фосфату додекагідрат, натрію хлорид, сорбіту розчин, бензалконію хлорид, олія евкаліптова, вода очищена.

Форма випуску. Спрей назальний.

Фармакотерапевтична група. Протинабрякові препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Симпатоміметики. Код АТС R01A A07.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Симпатоміметичний засіб з α_2 -антагоністичними властивостями. Після нанесення на слизову оболонку носової порожнини протягом декількох годин спостерігається судинозвужувальний ефект. Набряк слизової оболонки носової порожнини швидко зменшується, що зумовлено активацією постсинаптичних α -рецепторів венозних судин і артеріол.

Фармакокінетика. Після розпилювання у носовій порожнині, як правило, всмоктуються кількості ксилометазоліну, що не мають системного ефекту і в крові не можуть бути виявлені.

Показання для застосування. Симптоматичне лікування гострого риніту інфекційної, вірусної та алергічної природи. У комплексному лікуванні запалення придаткових пазух носа та середнього отиту. Зняття набрякості слизової оболонки носової порожнини в перед- чи післяопераційний період хірургічних втручань у ділянці носа. Можливе застосування з діагностичною метою. Спрей назальний Др. Тайсс призначений для дорослих і дітей віком від 6 років.

Спосіб застосування та дози. Дорослим і дітям віком від 6 років вприскувати, залежно від потреби, по 1 разу в кожную ніздрю один чи кілька разів на день, але не більше чотирьох.

Необхідно слідкувати за тим, щоб не перевищувати вказані дози. Це особливо стосується пацієнтів літнього віку та дітей.

Курс лікування – не більше 14 днів. Тривале застосування препаратів від нежитю, що знімають набряк слизової оболонки носа, може спричинити хронічну набряклість, а згодом – атрофію слизової оболонки носа.

Побічна дія. В особливо чутливих пацієнтів після застосування Спрею назального Др.Тайсс може відчуватися слабе короткочасне печіння у носі. В окремих випадках може виникнути пересихання слизової оболонки носа чи як наслідок – збільшитися кровонаповнення (реактивна гіперемія). Інколи під час лікування спостерігалися головний біль і сонливість; ці побічні ефекти могли бути пов'язані з основною хворобою.

Протипоказання. Спрей назальний Др. Тайсс не можна застосовувати при підвищеній чутливості до діючої речовини – ксилометазоліну гідрохлориду та до допоміжної речовини – бензалконію хлориду, при запаленні слизової оболонки носа без виділення секрету, а також при підвищеному внутрішньоочному тиску (закритокутова глаукома), при деяких післяопераційних станах

(трансфеноїдальна гіпофізектомія, трансназальні та трансоральні втручання, при яких оголюється тверда мозкова оболонка). Не дозволяється тривале застосування судинозвужувальних засобів при хронічному запаленні слизової оболонки носа. Не рекомендується застосовувати препарат у період вагітності та годування груддю.

Не застосовувати дітям віком до 6 років.

Передозування. При застосуванні вищих доз препарату необхідно звернути увагу на можливі системні наслідки (підвищення артеріального тиску, порушення серцевого ритму).

При появі таких наслідків необхідно припинити застосування препарату і вжити симптоматичних заходів.

Особливості застосування. Для забезпечення тонкого потоку флакон після відкриття слід тримати вертикально. Насадку флакона вводять у кожен ніздрю і різко натискають один раз на розпилювач. Під час вприскування повітря втягується носом.

Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати зі складними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При одночасному застосуванні Спрею назального Др. Тайсс і медикаментів, що підвищують артеріальний тиск, слід зважати на співвідношення користі та ризику через можливе взаємопідсилення ефектів цих препаратів.

Хворі на діабет, які приймають протидіабетичні засоби та інсулін, можуть застосовувати цей препарат тільки під наглядом лікаря.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С в місцях, недоступних для дітей.

Термін придатності – 3 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Спрей назальний Др. Тайсс після першого відкриття може зберігатися не більше 4 тижнів.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. 10 мл спрею в поліетиленовому флаконі у картонній коробці.

Виробник. Др. Тайсс Натурварен ГмбХ.

Адреса. Міхелінштрассе, 10
66424 Хомбург
Німеччина.