

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
Валеріани настойка
(Tinctura Valerianae)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від жовто-червоного до червоно-бурого кольору, характерного запаху. Допускається утворення осаду.

склад: 1 флакон містить настойку кореневищ з коренями валеріани подрібнених (1:5);

допоміжні речовини: спирт етиловий 70 %.

Форма випуску. Настойка.

Фармакотерапевтична група. Седативні та снодійні препарати. Код АТХ N050 M09.

Фармакологічні властивості.

Фармакокінетика. Виявляє седативні, снодійні, анагетичні, спазмолітичні властивості.

Біологічно активні речовини, що містяться в коренях та кореневищах валеріани (ефірна олія, валеріанова кислота, борнеол, алкалоїди, дубильні речовини, цукри), уповільнюють процеси збудження в центральній нервовій системі. Проявляє седативний, снодійний, анагетичний та спазмолітичний ефекти.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. Функціональні розлади діяльності центральної нервової системи (підвищена збудливість, дратівливість, розлади сну), серцево-судинної системи (нейроциркуляторній дистонії), спазми органів шлунково-кишкового тракту.

Спосіб застосування та дози. Валеріани настойку застосовують внутрішньо. Дорослим рекомендується приймати по 20-30 крапель настойки 3-4 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту, дітям віком від 12 років - із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя протягом 2 місяців.

Побічна дія. Пригнічення емоційних реакцій, сонливість, зниження працездатності. Можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння шкіри, висипи, свербіж тощо).

Протипоказання. Депресія та інші розлади, що супроводжуються пригніченням центральної нервової системи, індивідуальна непереносимість будь-якого з компонентів препарату.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настойку не рекомендується приймати жінкам у період вагітності та годування груддю, дітям віком до 12 років.

Передозування. При передозуванні препарату можливий розвиток виражених побічних реакцій: головний біль, запаморочення, сонливість, загальна слабкість, біль у животі, нудота, зниження гостроти слуху та зору, відчуття серцебиття.

У разі передозування необхідно негайно припинити застосування препарату і вчасно вжити заходи екстреної допомоги (промивання шлунка, прийом активованого вугілля тощо) та симптоматичне лікування.

Особливості застосування. При застосуванні препарату слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Валеріани настойка має здатність потенціювати дію серцевих, седативних, снодійних, анагетичних та спазмолітичних засобів.

Умови та термін зберігання. Зберігати в прохолодному (8-15°C), захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Термін придатності - 5 років.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Флакони-крапельниці по 25 мл, флакони по 30 мл.

Виробник. Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян".

Адреса. Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян".
Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Немиринці, вул. Держинського, 58.

Україна,