

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
РАФАХОЛІН Ц
(RAPHASCHOLIN C)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: круглі двояковипуклі таблетки, вкриті блискучою оболонкою, чорного кольору. На зламі – чорне ядро, оточене біло-чорною оболонкою.

склад: 1 драже містить:

екстракту чорної редьки з вугіллям активованим сухого	150 мг,
екстракту трави артишоку густого	47 мг,
кислоти дегідрохолевої	40 мг,
олії м'яти перцевої	15 мг;

допоміжні речовини: цукор, желатин, гуміарабік, кальцію гідрофосфат, кремнію діоксид колоїдний, тальк, магнію стеарат, вугілля медичне, крохмаль картопляний.

Форма випуску. Драже.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки, жовчовивідних шляхів. Різні препарати, включаючи комбінації.

Код АТС А05А Х10**.

Фармакологічні властивості. Комплексний препарат чинить жовчогінну і стимулює жовчоутворюючу функцію печінки. Препарат безпосередньо впливає на печінку, стимулює секреторні функції й збільшує кількість жовчі. Має захисний вплив на паренхіму печінки, посилює перистальтику кишечника, чинить також спазмолітичну і сечогінну дію.

Показання для застосування. Дискінезія жовчного міхура, диспепсія, диспептичні явища (здуття, запори); як засіб допоміжної терапії при запаленні жовчних шляхів і жовчного міхура; “застійний” жовчний міхур.

Спосіб застосування та дози.

Препарат призначений для внутрішнього застосування.

Підліткам старше 12 років і дорослим призначають по 1 або 2 драже 3 рази на добу після їди.

При здутті живота – по 2 драже дорослим вранці і ввечері, за півгодини до прийому їжі.

Побічна дія. В окремих випадках – рідкі випорожнення, жовчна коліка, алергічні реакції на компоненти препарату.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Тяжкі захворювання печінки, непрохідність жовчних шляхів, гострі і хронічні запалення шлунка та кишечника, жовчокам'яна хвороба. Діти до 12 років. III триместр вагітності.

Передозування.

Симптоми: блювання, пронос, головний біль, почервоніння обличчя, порушення дихання, порушення серцевого ритма, м'язові скорочення, відчуття втомленості, нудота. Терапія симптоматична.

Особливості застосування.

Клінічних досліджень, щодо застосування препарату у дітей віком до 12 років, не проводилось.

Вагітність і лактація

У I і II триместрі вагітності та під час годування груддю препарат можна застосовувати з урахуванням співвідношення ризик/користь. У III триместрі вагітності препарати, які містять артишок, протипоказані.

Вплив на здатність керувати автомобілем і механізмами.

Лікарський засіб безпечний і не впливає на психомоторні реакції і на швидкість реакції при керуванні автотранспортом та іншими механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.

У високих дозах з гіпотензивними та сечогінними засобами може спричинити гіпокаліємію.

При одночасному застосуванні з гіпохолестеринемічними засобами посилюється ефект Рафахоліну Ц.

Умови та термін зберігання.

Зберігати при температурі 5-25 °С, в недоступному для дітей місці. Берегти від світла та вологи.

Термін придатності – 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови відпуску.

Без рецепта.

Упаковка.

По 30 драже у блістері з плівки PVC та алюмінієвої фольги, в картонній пачці.

Виробник.

Вроцлавське Підприємство Лікарських Трав “Гербаполь” АТ.

Wroclaw Herb Factory “Herbapol” S.A., Poland.

Адреса.

50-951 Вроцлав, вул. Св. Миколая, 65/68, Польща.

50-951 Wroclaw, St.Nikolay, 65/68, Poland.