

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

СУЛЬФАЦИЛ
(SULFACIL)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: sulfacetamide; N- (4-амінофеніл)сульфоніл ацетамід натрій моногідрат;

основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина;

склад: 1 мл розчину містить сульфацилу натрію в перерахуванні на 100 % речовину 200 мг або 300 мг;

допоміжні речовини: натрію тіосульфат; 1 М розчин хлористоводневої кислоти до рН 8,0; вода для ін'єкцій.

Форма випуску. Краплі очні.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в офтальмології. Сульфаніламіді. Код АТС S01A B04.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Сульфацил має бактеріостатичний ефект щодо грамполозитивних і грамнегативних бактерій – стрептококів, пневмококів, гонококів, кишкової палички, хламідій, актиноміцетів. Механізм дії препарату зумовлений конкурентним антагонізмом з пара-амінобензойною кислотою (ПАБК) і конкурентним пригніченням дигідропротоатсинтезази, що призводить до порушення синтезу тетрагідрофолієвої кислоти, необхідної для синтезу пуринових і піримідинових основ. Внаслідок цього порушується синтез нуклеїнових кислот (ДНК та РНК) бактеріальних клітин і гальмується їх розмноження.

Фармакокінетика. При інстиляції на кон'юнктиву сульфацил проникає в око, де і справляє специфічний антибактеріальний вплив. Діє переважно місцево, але частина препарату всмоктується через запалену кон'юнктиву і потрапляє у системний кровотік.

Показання для застосування. Інфекційно-запальні захворювання очей, спричинені чутливими до дії препарату бактеріями: кон'юнктивіти, блефарити, гнійні виразки рогівки, гонорейні захворювання очей у дорослих і дітей. Профілактика бленореї у новонароджених.

Спосіб застосування та дози. Дорослим Сульфацил закапують по 2-3 краплі в уражене око 5–6 разів на добу (через кожні 4–5 год). Для дітей застосовують розчин 200 мг/мл по 1-2 краплі в уражене око 4-5 разів на добу. Курс лікування залежить від тяжкості захворювання. Для профілактики бленореї новонароджених у кожне око безпосередньо після народження закапують по 2 краплі розчину 300 мг/мл препарату, а потім по 2 краплі через 2 год після народження.

Побічна дія. В окремих випадках може статися подразнення тканин ока (почервоніння, свербіж, набряк повік).

Протипоказання. Гіперчутливість до компонентів препарату та сульфациламідів в анамнезі.

Передозування. При частішому застосуванні препарату може виникати почервоніння, свербіж, набряк повік. У такому разі лікування продовжують розчином Сульфацилу меншої концентрації, якщо необхідно - призначають симптоматичне лікування або відмінюють препарат.

Особливості застосування. Пацієнти з підвищеною чутливістю до фуросеміду, тiazидних діуретиків (гідрохлортiazид), похідних сульфонілсечовини (глібенкламід), інгібіторів карбоангідрaзи (діакарб) можуть мати підвищену чутливість до Сульфацилу. У терапевтичних дозах Сульфацил застосовують у період вагітності та годування груддю з урахуванням співвідношення ризик/користь.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При сумісному застосуванні з новокаїном, дикаїном, анестезином бактеріостатичний ефект зменшується; дифенін, ПАСК, саліцилати посилюють токсичність Сульфацилу; при застосуванні з антикоагулянтами непрямої дії підвищується специфічна активність останніх. Сульфацил при місцевому застосуванні несумісний із солями срібла.

Умови та термін зберігання. Зберігати в захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 8 С до 15 С.

Термін придатності – 2 роки. Після розкриття флакона препарат придатний протягом 28 діб.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 5 мл або 10 мл у флакон поліетиленовий, вкладений у пачку.

Виробник. ВАТ «Фармак».

Адреса. 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.