

І н с т р у к ц і я
для медичного застосування препарату:
ТУССИН
(TUSSIN)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назва: *guaifenesin,*

3-(2-метоксифенокси)-1,2-пропандіол;

основні фізико-хімічні властивості: темно-червоний сироп з медичним вишневим смаком та запахом;

склад: 5 мл сиропу містить 100 мг гуайфенезину;

допоміжні речовини: карамель, гліцерин, сироп кукурудзяний, кислота лимонна, натрію бензоат, вишнева смакова добавка, барвник червоний №40, натрію сахарин, пропіленгліколь, ментол, вода очищена.

Форма випуску. Сироп для перорального застосування.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальний засіб. Код АТС: R05CA03.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Гуайфенезин знижує в'язкість мокротиння і полегшує його відходження шляхом стимуляції секреції компонентів бронхіального слизу з низькою щільністю, деполімеризації кислих мукополісахаридів і підвищення функціональної активності в'язкого епітелію дихальних шляхів.

Гліцерин і кукурудзяний сироп чинять локальну пом'якшувальну дію на слизову оболонку глотки, зменшуючи подразнення в горлі.

Фармакокінетика. Після прийому внутрішньо гуайфенезин добре всмоктується зі шлунково-кишкового тракту, швидко метаболізується і екскретується нирками у вигляді метаболітів.

Показання до застосування. Використовують при інфекційно-запальних захворюваннях органів дихання для полегшення відходження густого, в'язкого мокротиння і зменшення подразнення слизової оболонки глотки.

Спосіб застосування і дози. Застосовують внутрішньо після їжі. Разова доза залежно від віку складає: від 2-х до 6 років – 50-100 мг гуайфенезину; від 6 до 12 років – 100-200 мг гуайфенезину; старшим 12 років і дорослим – 200-400 мг гуайфенезину. Приймають через кожні 4 години. Тривалість прийому при лікуванні гострих інфекційно-запальних захворювань органів дихання становить звичайно 3 - 5 днів. При лікуванні хронічних станів тривалість лікувального курсу може бути збільшена до кількох тижнів. Суворих обмежень щодо тривалості прийому не існує.

Побічна дія. Може спостерігатися при передозуванні або підвищеній індивідуальній чутливості до інгредієнтів препарату. Виявляється нудотою, блюванням, болем в епігастральній ділянці, сонливістю.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до інгредієнтів препарату.

Передозування. Можливо посилення проявів описаних побічних дій.

Особливості застосування. Дотримуватись обережності при призначенні препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, а також на фоні загострення виразкової хвороби шлунка.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Може застосовуватися сумісно з бронхолітиками, протимікробними засобами, серцевими глікозидами.

Умови і термін зберігання.

В сухому, недоступному для дітей місці при температурі 15 - 30 С.

Термін придатності 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упакування. Пластиковий флакон по 118 мл з мірною скляночкою в картонній упаковці.

Виробник. Сагмел, Інк.,

Адреса. FAMAR, S.A.

63, Ag. Dimitrou str.

174 56 Alimos, Athens, Greece