

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
Глоду настояка
(Tinctura Crataegi)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовтувато-коричневого кольору, допускається утворення осаду при зберіганні;

склад: 1 флакон містить настояку плодів глоду (1:10);

допоміжні речовини: спирт етиловий 70 %.

Форма випуску. Настояка.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в кардіології.

Код АТС С01ЕВ04.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Завдяки вмісту тритерпенових кислот (олеїнової, урсолової, кратегової) препарат посилює скорочення серцевого м'яза, кровообіг у коронарних судинах серця і в судинах мозку, підвищує чутливість серця до дії серцевих глікозидів. Завдяки вмісту ацетилхоліну глоду настояка зменшує збудливість міокарда. Препарат чинить незначну антигіпертензивну дію.

Препарат добре всмоктується при пероральному введенні. Ефект настає через 0,5 - 1 год.

Показання для застосування. Функціональні розлади серцевої діяльності.

Спосіб застосування та дози. Глоду настояку приймають внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настояки 3 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту (нормалізація артеріального тиску, уповільнення серцебиття тощо). Дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя. Термін лікування – від 6 тижнів.

Побічна дія. Рідко спостерігається сонливість, значне уповільнення серцевого ритму.

Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до препарату. Дитячий вік до 12 років. Вагітність, період годування груддю.

Передозування. Можливі сонливість, брадикардія. Виникнення цих явищ потребує відміни препарату і вчасного вжиття заходів екстреної допомоги (промивання шлунка, застосування активованого вугілля тощо) та симптоматичне лікування.

Особливості застосування. Препарат не рекомендують приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з її компонентами.

Слід утримуватись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Препарат посилює ефекти серцевих глікозидів. Не рекомендується прийом з солями алкалоїдів у зв'язку з можливістю утворення небажаних комплексів.

Умови та термін зберігання. Зберігати в прохолодному (8-15°C), захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Термін придатності – 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Флакони-крапельниці по 25 мл, флакони по 40 мл або по 100 мл.

Виробник. Дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного підприємства «Ян».

Адреса. Дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного підприємства «Ян».

Україна, Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Немиринці, вул. Держинського, 58.