

АФАЛА
Таблетки
ЛИСТОК – ВКЛАДИШ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Прочитайте уважно цей листок – вкладиш, перш ніж розпочати застосування препарату!

Зберігайте цей листок – вкладиш. Вам може знадобитись перечитати його.

Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем.

Цей препарат призначений особисто Вам, тому не слід передавати його іншим особам. Це може завдати шкоди їхньому здоров'ю, навіть якщо симптоми їхнього захворювання подібні до тих, які спостерігаються у Вас.

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 таблетка містить антитіла до простатоспецифічного антигену афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень C12, C30 та C200 – 0,003 г (3 мг);
допоміжні речовини: лактоза, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.

Лікарська форма.

Таблетки.

Фармакотерапевтична група.

Гомеопатичний препарат. Засоби, які застосовуються при доброякісній гіперплазії передміхурової залози.

Фармакологічні властивості. Препарат зменшує явища набряку та запалення у передміхуровій залозі, нормалізує її функціональний стан при запаленні. Покращує уродинаміку, знижує об'єм залишкової сечі, нормалізує тонус нижніх відділів сечовивідних шляхів, сприяє зменшенню дизуричних розладів (часті позиви до сечовипускання, у тому числі і нічні, ускладнення при сечовипусканні, біль або дискомфорт в області промежини).

Показання.

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози I і II стадії, яка супроводжується дизуричними розладами.

У складі комплексної терапії гострого та хронічного простатитів, які супроводжуються дизуричними розладами (одночасно з протизапальними та антибактеріальними засобами).

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Застереження при застосуванні.

Перед початком лікування порадьтеся з лікарем!

Взаємодія з лікарськими засобами.

Випадки несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровані.

Якщо Ви застосовуєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це лікаря! Під час лікування препаратом не застосовуйте ніяких інших лікарських засобів (у тому числі і тих, що відпускаються без рецепта) без попередньої консультації з лікарем. Неконтрольоване лікування може зашкодити Вашому здоров'ю.

Спосіб застосування та дози.

Препарат приймають по 1–2 таблетки до 4 разів на добу у перервах між прийомами їжі.

Таблетку тримають у роті (не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.

Тривалість рекомендованого курсу лікування до 16 тижнів.

При необхідності можливе проведення додаткового курсу лікування через 1,5 – 2 місяці за рекомендацією лікаря.

При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, зумовлені наповнювачами у складі лікарської форми. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції на компоненти препарату.

У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій обов'язково порадьтеся з лікарем щодо подальшого застосування препарату!

Термін придатності.

Термін придатності – 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 20 таблеток у блістері, по 2 або 5 блістерів у картонній коробці.

Правила відпуску. Без рецепта.

Назва та адреса виробника.

ТОВ “НВФ “Матеріа Медика Холдинг”, Російська Федерація.

Росія, 127473, м. Москва, 3-й Самотечний пров., буд. 9,

тел./факс +7 (495) 684-43-33.