

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПРОСТАМЕД
(PROSTAMED®)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: коричневі, круглі таблетки з опуклою поверхнею;

склад: 1 таблетка містить 200 мг борошна насіння гарбуза, 100 мг гарбузового глобуліну, 2,6 мг сухого екстракту золотушника (5–8:1), екстрагент: етанол

60 об. %, 6,3 мг сухого екстракту листя осики (5–8:1), екстрагент: етанол 60 об. % ;

допоміжні речовини: какао порошок, лактоза, сахароза, кальцію гідрофосфат, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, желатин, гліцерин, натрію хлорид, повідон.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при доброякісній гіпертрофії передміхурової залози.

Код АТС G04C E50.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинамика. У препараті міститься глобулін, одержаний з насіння *Cucurbita pepo* (гарбуза звичайного). З 15 амінокислот, виділених з цього глобуліну та ідентифікованих на сьогодні, особливе значення має глютамінова кислота. Каталізуючи окиснювальне дезамінування амінокислот, вона знижує патологічно підвищений рівень вільних амінокислот в тканині гіпертрофованої передміхурової залози. В результаті зменшується кількість амінокислот, які можуть використовуватись для біосинтезу білків, і уповільнюється проліферація тканини передміхурової залози. У насінні гарбуза міститься кукурбітин, фітостерини у вільній і зв'язаній формі, токоферолі, а також мінеральні речовини, насамперед селен. *Solidago* (золотушник) підвищує фільтраційну здатність нирок і тим самим протидіє утворенню залишкової сечі при аденомі передміхурової залози II стадії. Підвищення тону мускулатури сечового міхура веде до поліпшення симптомів розладів сечовиділення, особливо дизурії, і до зменшення кількості залишкової сечі. *Solidago* має протизапальну, спазмолітичну та сечогінну дію. *Populus tremula* (осики) міститься багато фенольних глікозидів, особливо саліцину, популіну та саліпопуліну. Саліцин окиснюється в організмі людини і перетворюється на саліцилову кислоту, яка чинить дезінфекційну дію при уретроциститі. Фенольні глікозиди, які мають безпечну і протизапальну дію, зменшують біль у передміхуровій залозі і чутливість сечового міхура.

Фармакокінетика. Дані по вивченню фармакокінетики відсутні.

Показання для застосування. Розлади сечовиділення при доброякісній гіперплазії (аденомі) передміхурової залози I–II стадій: утруднене сечовипускання, часте сечовипускання, у тому числі, у нічний час, відчуття неповного випорожнення сечового міхура (наявність залишкової сечі), непереборні позиви до сечовипускання. Гострий та хронічний простатит (у складі комплексної терапії).

Спосіб застосування та дози. Дорослим застосовувати по 2 - 4 таблетки 3 рази на день. Таблетки слід подрібнити і проковтнути, запиваючи невеликою кількістю рідини.

Тривалість застосування: до зникнення скарг, але не менше, ніж 12 тижнів.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Побічна дія. В окремих випадках можливі алергічні реакції при відомій гіперчутливості до саліцилатів.

Протипоказання. Гіперчутливість до саліцилатів.

Передозування. Шкідливі впливи передозування дотепер не відомі.

Особливості застосування. Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з точними механізмами.

Препарат не призначений для лікування дітей.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Дотепер не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати при кімнатній температурі (15 -25 °С) у недоступному для дітей місці.

Не можна зберігати в холодильнику.

Термін придатності - 3 роки.

Не застосовувати після дати закінчення терміну придатності, зазначеної на упаковці.

Зауваження. Побіління або поява нальоту на поверхні таблеток не свідчить про зниження якості препарату. Це спричинено ліпідним окисненням, яке зумовлене наявністю какао в препараті Простамед. Побіління і наліт зникають при легкому нагріванні таблеток і стосуються тільки зовнішнього вигляду препарату.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 60, 120, 200 таблеток у тубі, по 1 тубі у картонній коробці.

Виробник. Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ.

Адреса. 77736 Целль ам Хармерсбах, Німеччина.