

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
КРОПИВИ ЛИСТЯ
(URTICAE FOLIA)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: подрібнена сировина: шматочки листя різної форми, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір темно-зелений. Запах слабкий. Смак гіркуватий;

порошок крупний: шматочки листя різної форми, темно-зеленого кольору, що проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм. Запах слабкий. Смак гіркуватий;

склад: кропиви листя.

Форма випуску. Листя.

Фармакотерапевтична група. Гемостатичні засоби рослинного походження.

Код АТС В02В Х04**.

Фармакологічні властивості. Листя кропиви містять глікозид уртицин, дубильні речовини, каротиноїди, хлорофіл, вітаміни К₁, С, В₂, В₃, органічні кислоти, флавоноїди, мікро- та макроелементи (кремній, залізо, мідь, марганець, бор, титан, нікель). Цей комплекс біологічно активних речовин має кровоспинну, діуретичну, загальнозміцнюючу, протизапальну та судинозвужувальну дію. Водні витяжки з листя кропиви збільшують вміст гемоглобіну та кількість еритроцитів, нормалізують склад крові; знижують рівень цукру в крові; сприяють регенерації слизових оболонок шлунково-кишкового тракту; нормалізують ліпідний обмін.

Показання для застосування. Легеневі, кишкові, маткові, гемороїдальні та інші кровотечі; анемії різної етіології; захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрити, коліти, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки).

Спосіб застосування та дози. 5 г (2 десертні ложки) листя вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі застосовують у теплом вигляді по 1/4-1/2 склянки 2-3 рази на день за 30 хв до їди. Діти, залежно від віку, – від 1 десертної ложки до 1/4 склянки 2-3 рази на день за 30 хв до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

2 фільтр-пакети вміщують у скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хв. Дорослі застосовують у теплом вигляді по 1/2-1 склянки 2-3 рази на день за 30 хв до їди. Діти, залежно від віку, – від 2 десертних ложок до 1/2 склянки 2-3 рази на день за 30 хв до їди.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Побічна дія. Можливий розвиток алергічних реакцій при підвищеній індивідуальній чутливості.

Протипоказання. Підвищена зсілість крові; кровотечі, спричинені кістою, поліпами та іншими пухлинами матки та її додатків; гіпертонія; вагітність.

Передозування. Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Особливості застосування. У жінок, які годують груддю, посилює лактацію.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Невідома.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.

Термін придатності - 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Подрібнена сировина по 30 г, 50 г у пачках із внутрішнім пакетом; порошок крупний по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20.

Виробник. ЗАТ “Ліктрави”.

Адреса. Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.