

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЗОЛОТА ЗІРКА

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 олівець-інгальатор містить ментолу – 658 мг, камфори – 124 мг, олії м'яти перцевої – 258 мг, олії евкаліптові – 65 мг, олії гвоздичної – 5 мг, олії корицевої – 6 мг.

допоміжні речовини: парафін рідкий.

Лікарська форма.

Бальзам в олівці для інгаляцій.

Всередині туби знаходиться фільтр циліндричної форми, просочений інгредієнтами; специфічний запах ефірних олій.

Назва і місцезнаходження виробника.

Центральна фармацевтична компанія № 5
м. Дананг, СР В'єтнам

Фармакотерапевтична група.

Комбіновані засоби для лікування захворювань порожнини носа.

Код АТС: R01A X30.

Фармакологічні властивості. Препарат належить до групи засобів, що стимулюють рецептори слизових оболонок, шкіри та підшкірних тканин. Має протизапальні, місцево зігріваючі, антисептичні, анестезуючі властивості, розширює капіляри, покращуючи таким чином кровопостачання та незначною мірою знижує кров'яний тиск, діє на рефлекторні центри центральної нервової системи, проявляючи стимулюючий ефект. Дія олівця-інгальатора проявляється послабленням запального процесу та рефлекторним усуненням болю (головного, м'язового), спричиненого грипом, застудними захворюваннями та іншими чинниками.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування запаморочення, головного болю, застуди, нежитю, нудоти.

Протипоказання.

Індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 3-х років.

Особливі застереження.

Виключно для зовнішнього застосування. Уникати контакту бальзаму з очима, слизовими оболонками та відкритими ранами.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або працювати зі складними механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат слід з обережністю застосовувати дітям у ділянці обличчя, оскільки він може спричинити бронхоспазм.

Спосіб застосування та дози.

Обережно вдихати, тримаючи інгальатор біля носа. По 1-2 вдихання в кожну ніздрю 10-15 разів на день, до зникнення симптомів.

Передозування.

При передозуванні іноді може з'явитися відчуття сильного тепла та печіння.

У такому разі слід припинити застосування препарату.

Побічні ефекти. При вдиханні інколи можливі алергічні реакції. У дітей можливий розвиток рефлекторного спазму.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дослідження щодо взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами не проводилися.

Термін придатності.

5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі 15 – 25⁰С. Зберігати у місцях, недоступних для дітей.

Упаковка.

Білого кольору пластмасова туба-олівець для інгаляцій з кришкою, що накручується. Всередині туби знаходиться фільтр циліндричної форми, просочений інгредієнтами; туба у картонній пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.