

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЗОЛОТА ЗІРКА

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 мл рідкого бальзаму містить ментолу – 280 мг; камфори – 88,8 мг; олії м'яти перцевої – 229 мг; олії евкаліптової – 1 мг; олії гвоздичної – 4,6 мг; олії корицевої – 3,8 мг.

допоміжні речовини: парафін рідкий, коричневий барвник.

Лікарська форма.

Бальзам рідкий для зовнішнього застосування.

Рідина коричнево-червоного кольору з запахом ефірних олій.

Назва і місцезнаходження виробника.

Центральна фармацевтична компанія № 5
м. Дананг, СР В'єтнам

Фармакотерапевтична група. Протисвербіжні засоби.

Код АТС: D04A X

Фармакологічні властивості Препарат належить до групи засобів, що стимулюють рецептори слизових оболонок, шкіри та підшкірних тканин. Має протизапальні, місцево зігріваючі, антисептичні, анестезуючі властивості, розширює капіляри, покращуючи таким чином кровопостачання та незначною мірою знижує кров'яний тиск, діє на рефлекторні центри центральної нервової системи, проявляючи стимулюючий ефект. Дія бальзаму рідкого проявляється послабленням запального процесу та рефлекторним усуненням болю (головного, м'язового), спричиненого грипом, застудними захворюваннями та іншими чинниками.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування при грипі, запамороченні, головному болю, застудах, нежиті; при укусах комах.

Протипоказання.

Індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 3-х років.

Особливі застереження.

Виключно для зовнішнього застосування. Уникати контакту бальзаму з очима, слизовими оболонками та відкритими ранами.

У поодиноких випадках можливі алергічні реакції. У разі появи таких реакцій слід припинити застосування препарату і змити його залишки з місць нанесення теплою водою з милом.

Діти.

Препарат слід з обережністю застосовувати дітям у ділянці обличчя, оскільки він може спричинити бронхоспазм.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або працювати зі складними механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Невелику кількість препарату нанести на болісні ділянки і втерти у шкіру (при головному болю – у скроні, потилицю; при нежиті – під ніздрями; при застудах розтерти спину, груди і живіт). При укусах комах нанести бальзам на місце укусу і втерти у шкіру.

Передозування.

При передозуванні іноді може з'явитися відчуття сильного тепла та печіння. Для зняття цих симптомів слід змити нанесений препарат водою з милом.

Побічні ефекти.

Дерматит (у дітей), інколи можливі алергічні реакції. У дітей при нанесенні на обличчя можливий розвиток рефлекторного спазму.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дослідження щодо взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами не проводилися.

Термін придатності.

5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі 15 – 25⁰С. Зберігати у місцях, недоступних для дітей.

Упаковка.

По 5 мл бальзаму у флаконі №1, у картонній паці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.