

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3%

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: перекис водню;
1 мл розчину містить перекису водню 30 мг;
допоміжні речовини: натрію бензоат, вода очищена.

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування 3 %.

Прозора, безбарвна рідина.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Славія 2000».
Україна, 25005, м. Кіровоград, вул. Варшавська, 91.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТС D08A X01.

Фармакологічні властивості.

При контакті розчину водню перексиду з uszkodженою шкірою та слизовими оболонками вивільнюється активний кисень, який сприяє очищенню ранової поверхні та інактивації органічних речовин (протеїн, кров, гній). При застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості мікроорганізмів. Препарат має кровоспинний ефект.

Показання для застосування.

Препарат застосовують для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому uszkodженні тканин, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до препарату. Не вводять у порожнини та глибокі рани (можливість емболії).

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Застосування розчину на пов'язку забезпечує безболісне зняття її з рани. Велика кількість піни, що утворюється, сприяє механічному очищенню рани від гною і тканинного детриту.

Водню перексид не можна використовувати для зрошення порожнин.

Препарат нестабільний у лужному середовищі, у присутності металів, складних радикалів деяких оксидантів, а також на світлі і в теплі. Слід уникати потрапляння розчину в очі.

Особливі застереження.

Відсутні.

Спосіб застосування та дози.

Водню перексид наносять на uszkodжену ділянку шкіри для дезінфекції ран *per se* (тобто без розведення). Для полоскання розчиняють 1 столову ложку в 1 склянці води; для аплікацій, обробки ранових поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділянки обробляють тампоном, просоченим розчином водню перексиду. Тривалість лікування залежить від досягнутого ефекту.

Передозування.

Не спостерігалось.

Побічні ефекти.

Можливе відчуття печіння в момент обробки рани. У деяких випадках при індивідуальній чутливості до компонентів препарату можливе виникнення місцевих алергічних реакцій. При тривалому застосуванні для обробки слизової оболонки рота можлива гіпертрофія сосочків язика.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря !

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що невідома.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей, прохолодному, захищеному від світла місці.

Упаковка.

По 40 мл та по 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.